

جزوه تکمیلی پیش بینی کنکور ۱۴۰۱

حاوی نکات مهم و سؤالات کنکورهای اخیر

مسعود پورقهرمان، سینا معصوم نیا، امیررضا بواناتی

طراحی و چاپ: نشر ویانو

بافت پوششی			
کجا یافت می‌شود؟		بافت پوششی، سطح بدن و سطح حفره‌ها و مجاری درون بدن (مانند دهان، معده، روده‌ها و رگ‌ها) را می‌پوشاند.	
ویژگی‌ها		✓ سلول‌هایی تک‌هسته‌ای که در انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. هستهٔ این سلول‌ها ممکن است در مرکز سلول قرار نداشته باشد. ✓ فاصلهٔ بین سلولی در این بافت معمولاً کم می‌باشد و بین آن‌ها فضای بین‌یاخته‌ای اندکی وجود دارد. ✓ این بافت رگ ندارد و اکسیژن و مواد غذایی خود را از طریق انتشار و از بافت پیوندی زیرین خود دریافت می‌کند. ✓ این بافت مادهٔ زمینه‌ای ندارد. ✓ در زیر یاخته‌های این بافت، بخشی به‌نام غشای پایه وجود دارد.	
غشای پایه		✓ شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی که یاخته‌های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت‌های زیر آن متصل نگه می‌دارد. ✓ در بافت‌های پوششی چندلایه، غشای پایه نمی‌تواند با همهٔ سلول‌های بافت در تماس باشد.	
انواع	سنگفرشی	مثل داخلی‌ترین لایهٔ رگ‌ها، خارجی‌ترین لایهٔ پوست، مخاط دهان، مری، بخش مبادلای دستگاه تنفس، درون شامه، برون شامه و پیراشامه، دیوارهٔ خارجی کیسول بومن	
	مکعبی	مثل لولهٔ پیچ‌خوردهٔ نزدیک	
	استوانه‌ای	مثل مخاط معده و روده	
	انواع خاص!	مثل بودوسیت‌ها یا یاخته‌های چتری مثانه (در کتاب درسی عنوان نشده است!)	

جمع بندی بافت پیوندی			
متشکل از	انواع یاخته‌ها		اشکال مختلفی دارند.
	رشته‌های پروتئینی		مانند رشته‌های کلاژن و ارتجاعی (کشسان)
	مادهٔ زمینه‌ای		مادهٔ زمینه‌ای بافت پیوندی ممکن است، مایع، جامد و یا نیمه جامد باشد.
انواع	پیوندی سست		✓ بافتی با مقاومت کم و انعطاف‌پذیری بالا ✓ این بافت معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند و ماده زمینه‌ای آن سست، شفاف، بی‌رنگ، چسبنده و مخلوطی از مولکول‌های درشت مثل گلیکوپروتئین است. ✓ در این بافت، سلول‌های چربی نیز می‌توانند دیده شوند.
	پیوندی رشته‌ای		✓ بافتی با مقاومت بیشتر اما انعطاف‌پذیری کمتر ✓ نسبت به بافت پیوندی سست، مادهٔ زمینه‌ای کمتر و تعداد یاخته‌های کمتری دارد. ✓ این بافت رشته‌های کلاژن (ضخیم) بیشتری دارد.
	چربی		✓ در این بافت یاخته‌های سرشار از چربی (تری‌گلیسرید) فراوان است. (تعداد زیاد سلول‌ها) ✓ این بافت بزرگ‌ترین ذخیرهٔ انرژی در بدن است و نقش‌های ضربه‌گیری و عایق حرارتی نیز دارد. ✓ این بافت در کلیه‌ها، روی کرهٔ چشم، مغز زرد استخوان و ... یافت می‌شود.
	استخوان		✓ بخشی از اسکلت بدن را ایجاد می‌کنند و سخت‌ترین بافت پیوندی است. انواع دراز کوتاه پهن نامنظم از دو بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.
	اسکلت برخی ماهیان نظیر کوسه صرفاً از غضروف تشکیل شده و فاقد استخوان می‌باشد.		

انواع	غضروف	رشته‌های الاستیک (ارتجاعی) زیادی دارد و در بخش‌هایی از بدن نظیر غضروف مفاصل، صفحات رشد تا قبل از استخوانی شدن، دستگاه تنفس و... دیده می‌شود. از این بافت در مهندسی بافت برای بازسازی لاله گوش و بینی استفاده می‌کنند.
	خون	نوعی بافت پیوندی که به‌صورت منظم و یک‌طرفه درون رگ‌های خونی جریان دارد. بخش سلولی شامل WBC، RBC و PLT خون از دو بخش تشکیل شده است خوناب (مایع میان بافتی خون)

ساختار لوله گوارش

در ساختار چین حلقوی در روده باریک دیده نمی‌شود.	بافت پیوندی سست و رگ دارد – در حفره شکمی، بخشی از صفاق می‌باشد.		لایه بیرونی
	ماهیچه مخطط اسکلتی	در دهان، حلق، ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج	لایه ماهیچه‌ای
	طولی (خارجی)	در دیگر قسمت‌های لوله گوارش	
	شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی + بافت پیوندی سست		
	حلقوی (داخلی)		
	✓ دیواره معده، یک لایه ماهیچه مورب (داخلی‌ترین) نیز دارد.		
در ساختار چین حلقوی در روده باریک دیده می‌شود.	بافت پیوندی سست + رگ‌های خونی و لنفی + شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی		لایه زیرمخاط
	ماهیچه صاف (در تحتانی‌ترین بخش مخاط روده مشاهده می‌شود)		لایه مخاطی
	بافت پیوندی سست + رگ‌های خونی و لنفی + غدد		
	سنگفرشی چندلایه در دهان و مری	بافت پوششی	
	استوانه‌ای تک‌لایه در روده و معده		

جمع‌بندی شیرۀ معده

حفره معده		مجارى غدد معده، به اين حفرات تخليه مى‌شود.	
		✓ از يك نوع سلول تشكيل شده كه مادهٔ مخاطى زيادى به‌همراه بى‌كربنات ترشح مى‌كنند.	
غده معده	ترشح‌كننده ماده مخاطى	ماده مخاطى زيادى ترشح مى‌كند و نسبت به سلول‌هاى اصلى به حفره معده نزديك‌تر است. ✓ اين سلول، بى‌كربنات ترشح نمى‌كند.	
	ياخته اصلى	ليپاز	
		پروتئاز - پيش‌ساز آن يعنى پپسينوژن (غيرفعال) بر اثر هيدروكلريدريك‌اسيد به پپسين (فعال) تبديل شده و پپسين موجب تبديل پروتئين‌ها به مولكول‌هاى كوچك‌تر (نه آمينواسيد) مى‌شود. ✓ پپسين خود با اثر بر پپسينوژن، تبديل آن را سريع‌تر مى‌كند.	
		فاكتور داخلى كه براى جذب B ₁₂ در روده باريك ضرورى است. ✓ جذب ويتامين B ₁₂ در رودهٔ بزرگ نيازمند فاكتور داخلى نمى‌باشد.	
	ياخته كنارى - سلول‌هايى با ظاهرى متفاوت و با هسته‌اى بزرگ‌تر	اسيد كلريدريك كه سبب تبديل پپسينوژن به پپسين نيز مى‌شود.	
ترشح‌كننده هورمون		اين سلول‌ها در مجاورت پيلور، گاسترين ترشح مى‌كنند كه سبب افزايش اسيدمعده و پپسينوژن مى‌شوند.	

جمع بندی زیر مربوط به گفتار آخر فصل ۲ دهمه (تنوع گوارش در جانداران) که قطعاً یک تست ازش تو کنکور میداد! با دقت بخونش




برخی جانداران، مواد مغذی (مونومرهای غذایی) را از سطح **یاخته** یا **بدن** و به طور **مستقیم** از محیط، دریافت می کنند. این محیط، آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان است. کرم کدو که **فاقد** دهان و دستگاه گوارش است، مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند.

✓ جاندارانی که مواد مغذی (مونومر) را به طور مستقیم از محیط دریافت می کنند، می توانند **تک سلولی** یا **پرسلولی** باشند.

✓ هر جاندار که مواد مغذی را از دستگاه گوارش جانور دیگری به دست می آورد، لزوماً انگل نیست؛ مثل باکتری هایی که در سیرابی گاو حضور دارند.

✓ بخش های مختلف بدن کرم کدو، اندازه های متفاوتی دارند.

✓ در یک انتهای بدن کرم کدو، یک بخش تقریباً گرد مشاهده می شود.



واکوئول گوارشی: پارامسی از آغازیان است و با حرکت **مژک ها** (نه تارک ها) غذا را از محیط به حفره دهانی منتقل می کند. در **انتهای** حفره، کیسه ای غشایی به نام واکوئول غذایی تشکیل می شود.

واکوئول غذایی درون سیتوپلاسم حرکت می کند. کافنده تن (لیزوزوم) به واکوئول می پیوندد و آنزیم های خود را به درون آن آزاد می کند. در نتیجه، واکوئول گوارشی تشکیل می شود. مواد گوارش یافته از این واکوئول خارج می شوند و مواد گوارش نیافته در آن باقی می مانند. به این واکوئول، واکوئول دفعی می گویند. **محتویات** این واکوئول از راه منفذ دفعی یاخته خارج می شود.

✓ پارامسی برخلاف کرم کدو **نمی تواند** مواد مغذی (مونومر) را از محیط جذب کند.

✓ در اطراف همه بخش های پارامسی، مژک مشاهده **نمی شود**؛ مثل منفذ دفعی.

✓ طول مژک های حفره دهانی نسبت به سایر مژک ها بیشتر است.


✓ از راه منفذ دفعی، محتویات واکوئول دفعی (نه خود واکوئول) خارج می شود.

✓ پیش از پیوستن لیزوزوم ها، ذره های غذایی ریزتر شده اند؛ یعنی در واکوئول غذایی پارامسی،

گوارش مکانیکی **صورت می گیرد**.

✓ با پیوستن لیزوزوم ها به واکوئول غذایی و تشکیل واکوئول گوارشی، میزان فسفولیپیدهای غشای واکوئول افزایش می یابد.

✓ در واکوئول گوارشی **بر خلاف** غذایی، آنزیم هایی نظیر لیپاز و پروتئاز یافت می شوند.



حفره گوارشی: گوارش در جانوری مانند هیدر در کیسه ای به نام حفره گوارشی انجام می شود. این حفره **فقط** یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد. یاخته های

(نه هر یاخته ای!) در این حفره، آنزیم هایی ترشح می کنند که فرایند گوارش به صورت برون یاخته ای را آغاز می کنند. یاخته های این حفره، ذره های غذایی را با درون بری (کاهش مساحت غشا و مصرف انرژی) دریافت می کنند. سپس فرایند گوارش به صورت درون یاخته ای در حفره گوارشی ادامه می یابد.

✓ جریان مواد در حفره گوارشی، **دوطرفه** می باشد.

✓ همه یاخته های حفره گوارشی، آنزیم ترشح **نمی کنند**.

✓ همه یاخته های حفره گوارشی، به جذب مواد غذایی **نمی پردازند**.

✓ در فضای درونی حفره گوارشی، مونومر تولید **نمی شود**.

✓ ضخامت هیدر در تمام طول آن یکسان **نیست**.

✓ در انتهای بدن هیدر، یک بخش برجسته و تقریباً گرد مشاهده می شود.

✓ در هیدر برخلاف پارامسی، گوارش برون سلولی نیز مشاهده می شود.

✓ در بدن هیدر **چهار** نوع سلول قابل مشاهده می باشد:

۱ یاخته های استوانه ای پوشاننده حفره گوارشی که می توانند **مژک دار** یا **بدون مژک** باشند.

۲ یاخته های مکعبی بیرونی


۳ یاخته های عصبی که در سراسر بدن هیدر پراکنده هستند.

۴ یاخته های ماهیچه ای که با یاخته های عصبی ارتباط دارند.

لوله گوارش: این لوله در اثر تشکیل مخرج، شکل می گیرد و امکان جریان یک طرفه غذا را فراهم می کند.

✓ در لوله گوارش، جریان مواد غذایی، یک طرفه می باشد.

ملخ، حشرهای گیاه خوار است و با استفاده از آرواره ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می کند. غذای خرد شده از طریق مری به چینه دان وارد می شود. چینه دان بخش حجیم انتهایی مری است که در آن غذا ذخیره و نرم می شود. سپس غذا به بخش کوچکی به نام پیش معده وارد می شود. دیواره پیش معده دندانیهایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کنند. معده و کیسه های معده، آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. جذب، در معده صورت می گیرد. مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده، به راست روده وارد و سپس از مخرج دفع می شوند.



✓ ملخ، گیاه خوار می باشد؛ پس در بدن آن آنزیم های تجزیه کننده سلولز یافت می شوند.

✓ گوارش مکانیکی در ملخ، پیش از ورود مواد غذایی به دهان دیده می شود.

✓ گوارش شیمیایی با تماس مواد غذایی با بزاق آغاز می شود.

✓ در ملخ، چندین غده بزاقی، محتویات خود را از طریق یک مجرای مشترک به دهان می ریزند.

✓ چینه دان در گوارش مکانیکی غذا نقشی ندارد.

✓ آنزیم های معده و کیسه های معده، به پیش معده وارد می شوند.

✓ یاخته های پیش معده توانایی ترشح آنزیم گوارشی ندارند.

✓ در ملخ برخلاف انسان، جذب اصلی مواد غذایی در معده رخ می دهد.

✓ غدد بزاقی نسبت به چینه دان شکمی تر می باشند و در زیر آن قرار گرفته اند.

✓ دهان ملخ در سطح شکمی آن و مخرج در سطح پشتی آن قرار دارد.

✓ پاهای عقبی ملخ نسبت به پاهای جلویی آن، بزرگ تر می باشند.

بخش عقبی معده در این پرندگان ساختاری ماهیچه ای است و سنگدان نامیده می شود. سنگریزه هایی که پرنده می بلعد، فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می کنند.

✓ برخی مواد غذایی بلع شده در پرندگان که ارزش غذایی چندانی ندارد مثل سنگریزه ها، فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می کنند.

✓ بلع سنگریزه ها توسط پرندگان دانه خوار با رفتار غذایی بهینه

توجیه نمی شود.

✓ در پرندگان دانه خوار، چینه دان از سنگدان بزرگ تر می باشد.

✓ سنگدان، پشتی ترین بخش لوله گوارش در پرندگان دانه خوار می باشد.

✓ کبد، ترشحات خود را از راه مجرای به روده باریک می ریزد.

✓ در پرندگان دانه خوار همانند انسان، طول روده باریک از روده


بزرگ بیشتر و قطر آن کمتر است.

✓ در انتهایی لوله گوارش پرندگان دانه خوار، ساختار این لوله


تغییراتی می کند.

✓ هر پای پرندگان دانه خوار، ۴ انگشت دارد که بین آن ها، پرده ای

مشاهده نمی شود.




پستانداران نشخوارکننده، نظیر گاو و گوسفند، معده چهارقسمتی دارند در این جانوران، معده، شامل کیسه بزرگی به نام سیرابی؛ بخشی به نام نگاری؛ یک اتاقک لایه‌لایه به نام هزارلا و معده واقعی یا شیردان است. این جانوران به سرعت غذا می‌خورند تا در فرصت مناسب با مکانی امن، غذا را با نشخوار کردن به دهان برگردانند و بچوند. ابتدا غذای نیمه جویده بلعیده و وارد سیرابی می‌شود و در آنجا به کمک میکروب‌ها تا حدی گوارش می‌یابد. در نشخوارکنندگان، وجود میکروب‌ها برای گوارش سلولز ضروری است. سلولز مقدار زیادی انرژی دارد ولی اغلب (نه بعضی) جانوران (نه پستانداران) فاقد توانایی تولید آنزیم لازم برای گوارش آن هستند.



توده‌های غذا سپس به نگاری وارد و به دهان برمی‌گردند. در این زمان غذا به‌طور کامل، جویده و دوباره به سیرابی وارد می‌شود، بیشتر حالت مایع پیدا می‌کند و سپس به نگاری جریان می‌یابد. مواد از آنجا به هزارلا رفته تا حدودی آگیری و سرانجام به شیردان وارد می‌شوند. در این محل آنزیم‌های گوارشی وارد عمل می‌شوند و گوارش ادامه پیدا می‌کند.

- ✓ در نشخوارکنندگان، گوارش میکروبی نسبت به آنزیمی، **زودتر** آغاز می‌شود.
- ✓ پس از ورود توده غذایی برای بار **دوم** به سیرابی، توده غذایی **بیشتر** حالت مایع پیدا می‌کند.
- ✓ جذب در معده گاو دیده می‌شود؛ آگیری (جذب آب و **افزایش** فشار اسمزی) در بخشی از معده به نام هزارلا رخ می‌دهد.
- ✓ منفذ بین مری و سیرابی از منفذ بین نگاری و هزارلا بزرگ‌تر است.
- ✓ مواد غذایی برای خروج از شیردان و ورود به روده باریک، به سمت بالا حرکت می‌کند.
- ✓ در فضای درون سیرابی گاو، برجستگی‌هایی مشاهده می‌شود.



بخش مبادله‌ای	نایژک مبادله‌ای		آخرین نایژک است که با وجود حبابک‌ها روی آن مشخص می‌شود و نهایتاً به کیسه‌های جبابکی ختم می‌شوند. نایژک مبادله‌ای نیز همانند نایژک‌های قبلی مخاط مزک‌دار دارد.
	دیواره حبابک	سلول‌های سنگفرشی که فراوان تراند و در مبادله گازهای تنفسی نقش دارند	
		سلول‌هایی با ظاهری متفاوت و تعداد کمتر که عامل سطح‌فعال را ترشح می‌کند.	
	حبابک‌ها	سلول‌هایی با ویژگی بیگانه‌خواری و حرکت که باکتری و ذرات گردوغبار را نابود می‌کنند. این سلول‌ها در پی خروج مونوسیت‌ها از خون و تغییر در آن‌ها پدید آمده‌اند.	
		اطراف حبابک‌ها را مویرگ‌های خونی پیوسته فراوانی احاطه کرده است.	


- ✓ ماکروفاژ جزئی از یاخته‌های دیواره حبابک نمی‌باشد.
- ✓ مویرگ‌های شش‌ها، از نوع پیوسته می‌باشد.
- ✓ به دلیل یافت شدن ماکروفاژ در شش‌ها، می‌توان گفت دیابوز از مویرگ‌های خونی پیوسته نیز انجام می‌شود.
- ✓ لنف شش راست به مجرای لنفی راست و لنف شش چپ به مجرای لنفی چپ می‌ریزد.
- ✓ هر نوزادی که زود به دنیا آمده، لزوماً کمبود سورفاکتانت ندارد.
- ✓ در نوزادانی که زود به دنیا آمده‌اند و به زحمت نفس می‌کشند، عامل سطح فعال یافت می‌شود اما کافی نمی‌باشد.
- ✓ سورفاکتانت توسط سلول‌های نوع دوم، به سطح داخل حبابک ترشح می‌شود.
- ✓ هسته یاخته سنگفرشی حبابک از هسته یاخته سنگفرشی مویرگ، بزرگ‌تر می‌باشد.
- ✓ در جاهای متعدد (نه هر جایی) بافت پوششی مویرگ و حبابک از یک غشای پایه مشترک استفاده می‌کنند.
- ✓ یک غشای پایه می‌تواند از هر دو طرف با سلول‌های بافت پوششی در تماس باشد.

ظرفیت تنفسی

ظرفیت تنفسی		ظرفیت تنفسی	
ظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی است.			
ظرفیت حیاتی	حجم ذخیره دمی	مقدار هوایی که پس از یکدم معمولی با یکدم عمیق می‌توان وارد شش کرد.	
	حجم جاری	مقدار هوایی که طی یکدم عادی وارد یا طی یک بازدم عادی خارج می‌شود. حجم جاری حدود ۵۰۰ mL می‌باشد.	
	حجم ذخیره بازدمی	مقدار هوایی که پس از یک بازدم معمولی با یک بازدم عمیق می‌توان از شش‌ها خارج کرد.	
حجم باقی‌مانده		✓ هوایی که همواره و حتی پس از یک بازدم عمیق در شش‌ها باقی می‌ماند. ✓ برخلاف هوای مرده، توسط دم‌سنج اندازه‌گیری نمی‌شود. ✓ این حجم باعث می‌شود حبابک‌ها همیشه باز بمانند و تبادل گازهای تنفسی بین دو تنفس انجام شود.	
هوای مرده (بخشی از هوای دمی)		✓ هوایی با حجم در حدود ۱۵۰ mL است که در بخش هادی دستگاه تنفس می‌ماند و به نایژک مبادله‌ای نمی‌رسد. ✓ این هوا یا بخشی از حجم جاری (طی دم عادی) و یا بخشی از حجم ذخیره دمی (طی دم عمیق) می‌باشد. این بخش با اسپیرومتر اندازه‌گیری می‌شود.	

- ✓ حجم‌های تنفسی را با اسپیرومتر اندازه‌گیری می‌کنند و نمودار حاصل از آن دمنگاره نام دارد.
- ✓ از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می‌آید.
- ✓ هورمون‌هایی نظیر ایپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین با گشاد کردن نایژک‌ها می‌توانند میزان هوای مرده را افزایش دهند.
- ✓ حجم‌ها در فرد سالم به سن و جنسیت بستگی دارند.

حالا که مباحث بالارو مرور کردین، بیاین باهم چندتا نقطه روی اسپیروگرام رو بررسی کنیم! از چپ به راست:



نقطه اول:

- ۱ حجم جاری در حال ورود به شش‌ها می‌باشد. (دم عادی)
- ۲ انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی و دیافراگم دیده می‌شود.
- ۳ در این زمان، هوای باقی‌مانده، جزئی از حجم جاری می‌باشد.
- ۴ انقباض دیافراگم، سبب وارد کردن فشار به سیاهرگ‌های مجاور خود و حرکت خون به سمت قلب می‌شود.
- ۵ در هنگام دم و با ایجاد فشار مکشی قفسه سینه، فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب برداشته می‌شود.

نقطه دوم:

- ۱ حجم ذخیره دمی، در حال ورود به شش‌ها است. (دم عمیق)
- ۲ علاوه بر انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی و دیافراگم، ماهیچه‌های گردنی نیز منقبض می‌شوند.
- ۳ در این زمان، هوای باقی‌مانده، جزئی از حجم ذخیره دمی می‌باشد.
- ۴ انقباض دیافراگم، سبب وارد کردن فشار به سیاهرگ‌های مجاور خود و حرکت خون به سمت قلب می‌شود.
- ۵ در هنگام دم و با ایجاد فشار مکشی قفسه سینه، فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب برداشته می‌شود.

نقطه سوم:

- ۱ ابتدا حجم ذخیره دمی و سپس حجم جاری در حال خروج از شش‌ها می‌باشند (بازدم معمولی)
- ۲ تا زمان خروج کامل هوای جاری، انقباض هیچ ماهیچه‌ای مشاهده نمی‌شود!
- ۳ ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی، دیافراگم و ماهیچه‌های گردنی در حال استراحت می‌باشند.

نقطه چهارم:

- ۱ در این زمان و پس از خروج کامل هوای جاری، با انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی و ماهیچه‌های شکمی، حجم ذخیره بازدمی از شش‌ها خارج می‌شوند. (بازدم عمیق)
- ۲ ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی، دیافراگم و ماهیچه‌های گردنی در حال استراحت می‌باشند.
- ۳ انقباض ماهیچه‌های شکمی، سبب وارد کردن فشار به سیاهرگ‌های مجاور خود و حرکت خون به سمت قلب می‌شود.

نقطه پنجم:

- ۱ در این زمان، شش‌ها در حال پر شدن می‌باشند و انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی و دیافراگم مشاهده می‌شود. (دم عادی)
- ۲ انقباض ماهیچه‌های شکمی در این زمان دیده نمی‌شود.
- ۳ انقباض دیافراگم، سبب وارد کردن فشار به سیاهرگ‌های مجاور خود و حرکت خون به سمت قلب می‌شود.
- ۴ در هنگام دم و با ایجاد فشار مکشی قفسه سینه، فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب برداشته می‌شود.

جمع‌بندی ساختار بافتی قلب

درون شامه		داخلی ترین لایه دیواره قلب است و شامل یک لایه نازک بافت پوششی است. ✓ ضخامت آن از برون شامه و پیراشامه کمتر می باشد.
زیر درون شامه، بافت پیوندی وجود دارد که درون شامه را به لایه میانی یا ماهیچه قلب می چسباند. ✓ درون شامه در تشکیل دریچه های قلب نیز شرکت می کند.		
ماهیچه قلب	ویژگی های ماهیچه قلب	لایه میانی و ضخیم ترین لایه دیواره قلب است که بیشتر از یاخته های ماهیچه ای قلبی تشکیل شده است.
		همانند ماهیچه اسکلتی، ظاهری مخطط دارد.
		همانند ماهیچه صاف، به طور غیر ارادی منقبض می شود.
		یاخته های آن بیشتر تک هسته ای و بعضی دو هسته ای اند.
		بر خلاف ماهیچه اسکلتی، هسته یا هسته های هر سلول، مرکزی اند.
		ارتباط از طریق صفحات بینابینی (در هم رفته) که به صورت عرضی قرار دارند؛ که سبب می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه ای قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت، مانند یک توده واحد عمل کند.

دیواره قلب	ماهیچه قلب	بین یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی، بافت پیوندی متراکم نیز قرار دارد. بسیاری (نه همه) از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به رشته‌های کلاژن موجود در این بافت پیوندی متصل می‌شوند. ✓ بافت پیوندی متراکم باعث استحکام دریچه‌های قلبی می‌شود.
	برون شامه	بیرونی‌ترین لایه دیواره قلب است که از بافت پوششی سنگفرشی و پیوندی متراکم تشکیل شده است.
جزئی از دیواره نیست!	پیراشامه	برون شامه روی خود برمی‌گردد و پیراشامه را به وجود می‌آورد. این لایه نیز از بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده است.
	۱) محافظت از قلب ۲) حرکات روان قلب	بین برون شامه و پیراشامه فضایی وجود دارد که با مایع پر شده است؛ این مایع دو وظیفه دارد:

جمع‌بندی وضعیت قلب


سیستول بطن‌ها	سیستول دهلیزها	دیاستول عمومی	مدت
۰/۳	۰/۱	۰/۴	
اندکی پس از ثبت موج QRS تا اندکی پس از ثبت موج T	اندکی پس از ثبت موج P تا اندکی پس از ثبت موج QRS	اندکی پس از ثبت موج T تا اندکی پس از ثبت موج P	محل بر روی نوار قلب
استراحت	انقباض	استراحت	دهلیزها
انقباض	استراحت	استراحت	بطن‌ها
بسته	باز	باز	دهلیزی-بطنی
باز	بسته	بسته	سینی
×	×	✓	تحریک گره اول
×	✓	×	تحریک گره دوم
×	در انتهای سیستول دهلیزی	×	بیشترین خون درون بطن
در انتهای سیستول بطنی	×	×	بیشترین خون درون دهلیز


وضعیت دریچه‌های قلب

نوع دریچه	چه زمانی باز است؟	چه زمانی بسته است؟	چه زمانی بسته می‌شود؟	زمان بسته شدن روی ECG	کدام صدای قلب را ایجاد می‌کند؟
دهلیزی - بطنی	دیاستول بطن (۵، ۰ ثانیه)	سیستول بطن (۳، ۰ ثانیه)	هنگام شروع انقباض بطن	کمی پس از QRS	صدای قوی، گنگ و طولانی‌تر
سینی	سیستول بطن (۳، ۰ بطن)	دیاستول عمومی + سیستول دهلیز (۵، ۰ ثانیه)	هنگام شروع استراحت عمومی	کمی پس از موج T	صدای کوتاه‌تر و واضح قلب

✓ موج P در بین موج‌های نوار قلب کمترین ارتفاع و QRS بیشترین ارتفاع را دارد است.

مقایسه و جمع بندی سرخرگ و سیاهرگ		
سیاهرگ	سرخرگ	
نوع خون	خون را از قلب دور می کند و معمولاً خون روشن دارد.	خون را به قلب نزدیک می کند و معمولاً خون تیره دارد.
ورود یا خروج	معمولاً خون را به اندام وارد می کند اما در برخی موارد می تواند خون را از اندام خارج کند؛ مثل سرخرگ آئورت	معمولاً خون را از اندام خارج می کند اما در برخی موارد می تواند خون را به اندام وارد کند؛ مثل سیاهرگ باب کبدی
بافت شناسی	هر دو از سه لایه اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از:	بافت پیوندی
		ماهیچه صاف + رشته های کشسان زیاد
		بافت پوششی سنگفرشی
مشخصات در برش عرضی	بافت پیوندی و ماهیچه ای زیادی دارد.	بافت پیوندی و ماهیچه ای کمی دارد.
شکل دهانه در نبود خون	بیضتر گرد دیده می شود.	حفره داخل آن ها گسترده تر است.
دریچه	دهانه آن ها در نبود خون باز است.	بسته می شود.
شبکه مویرگی	در قلب و در ابتدای آن ها، دریچه وجود دارد.	در بسیاری از سیاهرگ ها (دست و پا) دریچه هایی وجود دارد.
محل قرار گیری در اندام ها	معمولاً قبل از شبکه مویرگی قرار دارند اما می توانند بعد از آن نیز دیده شوند؛ مثل سرخرگ و ابران	معمولاً بعد از شبکه مویرگی قرار دارند اما می توانند قبل از آن نیز دیده شوند؛ مثل سیاهرگ باب
گیرنده ها	بیشتر سرخرگ های بدن در قسمت های عمقی هر اندام قرار دارند.	سیاهرگ ها بیشتر در سطح قرار دارند.
	گیرنده فشار خون دیواره رگ ها	گیرنده هایی دمایی در برخی سیاهرگ های بزرگ
	گیرنده میزان اکسیژن در آئورت	
بند ناف	گیرنده درد در دیواره سرخرگ ها	دو عدد
	یک عدد	خون را از جنین به جفت می برد.
	خون را از جنین به جفت می برند.	پیچ خوردگی کمتر
ویژگی ها	پیچ خوردگی بیشتر	قشر بیشتر
	قشر کمتر	جهت حرکت خون در بیشتر آن ها به سمت بالاست.
	تغییر حجم سرخرگ به دنبال هر انقباض بطن، نبض نام دارد.	
مویرگ ها		
ویژگی ها	✓ سرخرگ های کوچک به مویرگ هایی منتهی می شوند که کوچک ترین رگ های بدن هستند. دیواره نازکی دارند و جریان خون در آن ها کند است. تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن در این رگ ها انجام می شود.	
	✓ شبکه وسیعی را در بافت ها ایجاد می کنند به طوری که فاصله بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود ۲۰ میکرومتر است؛ این فاصله کم، مبادله سریع مولکول ها را از طریق انتشار، آسان تر می کند.	
ساختار	✓ دیواره نازکی دارند و جریان خون در آن ها کند است.	
	✓ دیواره مویرگ ها فقط از یک لایه یاخته های پوششی سنگفرشی ایجاد شده و ماهیچه صاف ندارد.	
	✓ سطح بیرونی مویرگ ها را غشای پایه احاطه می کند.	

انواع	پیوسته	ارتباط تنگاتنگ یاخته‌های پوششی	غشای پایه پیوسته‌ای دارند.	در دستگاه عصبی مرکزی یافت می‌شوند.
	منفذدار	وجود منافذ در غشای سلول‌های پوششی	غشای پایه پیوسته و ضخیم که عبور مولکول‌های درشت را محدود می‌کند.	در کلیه‌ها دیده می‌شوند.
	ناپیوسته	فاصله زیاد یاخته‌های پوششی به شکل حفره مشاهده می‌شود.	غشای پایه در این مویرگ‌ها، پیوسته نبوده و ناقص می‌باشد...	در جگر یافت می‌شوند.
تبادل مواد در مویرگ‌ها	از چه محلی عبور می‌کنند؟		مولکول‌های مواد ممکن است از غشای یاخته‌های پوششی مویرگ‌ها و یا از فاصله بین این یاخته‌ها عبور کنند. نوع عبور را اندازه مولکول‌ها و همچنین میزان انحلال آن‌ها در لیپیدهای غشا مشخص می‌کند.	
	عوامل مؤثر در تبادل مواد		فشار تراوشی	در ابتدای سرخرگی مویرگ، فشار خون که به آن فشار تراوشی می‌گویند، باعث خروج مواد از مویرگ می‌شود.
			فشار اسمزی خون	در نتیجه خروج بخشی از خوناب (به جز مولکول‌های درشت) فشار اسمزی درون مویرگ به تدریج افزایش می‌یابد؛ به طوری که در بخش سیاهرگی مویرگ، فشار اسمزی درون مویرگ از بافت‌های اطراف آن بیشتر است.
			فشار اسمزی بافت	*در سمت سرخرگی: فشار اسمزی بافت بیشتر و نیرویی به سمت خارج مویرگ دارد. *در سمت سیاهرگی: فشار اسمزی خون بیشتر است و نیرویی به سمت داخل مویرگ دارد.
			فشار بافت	در بخش سیاهرگی، فشار تراوشی خون از فشار آب میان بافتی کمتر است.
	تأثیر عوامل		فشار تراوشی سبب خروج خوناب از مویرگ و فشار آب میان بافتی سبب بازگشت مواد به مویرگ می‌شود. فشار اسمزی خون سبب ورود مواد به مویرگ و فشار اسمزی بافت سبب ورود مواد به مویرگ می‌گردد. ✓ برهم کنش نیروهای ذکر شده، سبب ورود یا خروج مواد از مویرگ می‌گردد.	
				
			خروج مواد از مویرگ	در سمت سرخرگی (بیشتر بودن فشار تراوشی و فشار اسمزی مایع بین سلولی)
			ورود مواد به مویرگ	در سمت سیاهرگی (بیشتر بودن فشار مایع بین سلولی و فشار اسمزی مویرگ)
			نه خروج و نه ورود!	تقریباً کمی بعد از میانه مویرگ، با برابر شدن تمامی فشار خون، مواد جابجا نمی‌شوند!
خیز یا آدم	تعریف	با کاهش بازگشت سرعت مایعات از بافت به خون، بخش‌هایی از بدن متورم می‌شوند به آن خیز یا آدم می‌گویند.		
	علل	کمبود پروتئین‌های خون - افزایش فشار خون درون سیاهرگ‌ها - مصرف کم مایعات - افزایش مصرف نمک		
		افزایش ترشح غیرطبیعی هورمون‌های آلدوسترون، اپی نفرین و نوراپی نفرین - کاهش ترشح هورمون ضدادراری		
		بیماری‌هایی نظیر سللیک یا اختلال در دریچه‌های لانه کبوتری		

جمع بندی دستگاه لنفی		
لنف	مایعی تشکیل شده از مواد متفاوت و گویچه های سفید	
رگ های لنفی	رگ هایی واجد دریچه یک طرفه کننده جریان مواد	
مجاری لنفی	مجاری لنفی راست و چپ که به سیاهرگ های زیرترقوه ای راست و چپ می ریزند.	
گره های لنفی	پراکندگی آن در بخش های مختلف بدن متفاوت است؛ مثلاً در زیر بغل و کشاله ران به تعداد بیشتری یافت می شوند.	
اجزا	لوزه ها	بیش از یک عدد می باشند و در پشت حلق قرار دارند.
	تیموس	✓ در جلوی دهلیز راست و پشت جناغ قرار گرفته است و از دو لب غیر هم اندازه تشکیل شده است. ✓ محل بلوغ لنفوسیت های T ✓ هورمون تیموسین را ترشح می کند و با افزایش سن، اندازه آن تحلیل می رود.
	طحال	✓ در سمت چپ حفره شکمی قرار گرفته و خون سیاهرگی آن به کبد می رود. ✓ همانند کبد، یکی از محل های تخریب گلبول های قرمز در فرد بالغ و تولید آن در دوران جنینی می باشد.
	آپاندیس	در سمت راست بدن قرار گرفته و روده کور به آن ختم می شود.
	مغز استخوان	در بافت اسفنجی استخوان دیده می شود.
	کار اصلی آن تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا می کنند و به مویرگ ها برنمی گردند.	
وظایف	انتقال چربی های جذب شده از دیواره روده باریک	
	از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی	
جریان لنف	لنف پس از عبور از مویرگ ها، گره های لنفی و رگ های لنفی، از طریق دورگ لنفی بزرگ به نام مجرای لنفی، به سیاهرگ های زیرترقوه ای چپ و راست می ریزد؛ بنابراین لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون بازمی گردد.	
	مجرای لنفی چپ بزرگ تر بوده و در ناحیه شکم (کمی پایین تر از طحال) شروع می شود و به سمت بالا می رود و با عبور از پشت قلب، نهایتاً به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ می ریزد. این مجرا ابتدا در وسط بدن قرار دارد اما کم کم به سمت چپ می رود. 	
	مجرای لنفی راست کوچک تر است و به سیاهرگ زیرترقوه ای راست می ریزد. ✓ لنف دست راست، سمت راست سر و گردن و سمت راست قفسه سینه توسط مجرای لنفی راست و لنف بقیه بخش های بدن توسط مجرای لنفی چپ دریافت می شود.	

جمع بندی گلبول های قرمز	
ویژگی ها	بیش از ۹۹ درصد یاخته های خونی را تشکیل می دهند و به خون ظاهری قرمز رنگ می دهند. این یاخته های کروی که از دو طرف حالتی فرورفته دارند، در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می دهند و سیتوپلاسم آن ها از هموگلوبین پر می شود. ✓ در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه قرمز، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهد.

نقش	نقش اصلی آن، انتقال گازهای تنفسی می‌باشد.	O _۲	بیشتر مقدار حمل آن در خون به‌وسیلهٔ هموگلوبین انجام می‌شود.
		CO _۲	هموگلوبین نقش کمتری در حمل کربن‌دی‌اکسید دارد. بیشترین مقدار کربن‌دی‌اکسید به صورت یون بی‌کربنات در گویچهٔ قرمز حمل می‌شود.
تولید	عوامل مورد نیاز	آهن	سبزیجات با برگ تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن می‌باشد.
		فولیک اسید	نوعی ویتامین از خانواده B که برای تقسیم طبیعی یاخته‌ای لازم است و کمبود آن باعث می‌شود یاخته‌ها به‌ویژه در مغز استخوان تکثیر نشوند و تعداد گویچه‌های قرمز کاهش یابد. سبزیجات با برگ‌تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع فولیک‌اسید می‌باشد.
		ویتامین B _{۱۲}	کارکرد صحیح فولیک‌اسید به وجود این ویتامین وابسته است. این ویتامین فقط در غذاهای جانوری وجود دارد. البته در رودهٔ بزرگ مقداری ویتامین B _{۱۲} تولید می‌شود.
	تنظیم تولید	وابسته به هورمون اریتروپویتین می‌باشد که از گروه ویژه‌ای از یاخته‌های کبد و کلیه به درون خون ترشح می‌شود و روی مغز استخوان اثر می‌گذارد تا سرعت تولید گویچه‌های قرمز را زیاد کند.	
محل تولید	پس از تولد	مغز استخوان	
	پیش از تولد	مغز استخوان، کبد و طحال	
تخریب	متوسط عمر این یاخته‌ها، ۱۲۰ روز است و روزانه تقریباً یک درصد از این سلول‌ها تخریب می‌شوند و باید جایگزین شوند. تخریب یاخته‌های خونی مرده و آسیب‌دیده در طحال و کبد انجام می‌شود. سرنوشت آهن آزاد شده در فرآیند تخریب: ۱ در کبد ذخیره می‌شود. ۲ به همراه خون به مغز استخوان رفته و در ساخت دوبارهٔ گویچهٔ قرمز به‌کار می‌رود.		
کم‌خونی داسی‌شکل	علت این بیماری نوعی تغییر ژنی است که باعث می‌شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجهٔ آن، تغییر شکل گویچه قرمز از حالت گرد به حالت داسی‌شکل است. ✓ در این بیماری، ترشح هورمون اریتروپویتین به درون خون افزایش خواهد یافت.		

یاخته‌های خونی سفید

نکات کلی	✓ در یک انسان سالم و بالغ، به همراه پلاکت‌ها، معمولاً کمتر از یک درصد حجم خون را تشکیل می‌دهند.
	✓ این یاخته‌ها، ضمن گردش در خون در بافت‌های مختلف بدن نیز پراکنده می‌شوند.
	✓ نقش اصلی (نه تنها نقش) آن‌ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.
	✓ همه این یاخته‌ها، فقط یک هسته دارند.
	✓ همه این یاخته‌ها، توانایی دیپدز (عبور از دیواره مویرگ در جهت خروج از خون) دارند.
	✓ لنفوسیت‌ها از یاخته بنیادی لنفوئیدی و سایر گلبول‌های سفید از یاخته‌های بنیادی میلوئیدی ایجاد می‌شوند.
	✓ لنفوسیت‌های B و T جزئی از دفاع اختصاصی و سایر گلبول‌های سفید جزئی از دفاع غیراختصاصی به‌شمار می‌روند.

نوع یاخته	هسته	سیتوپلاسم	عملکرد
بازوفیل	دو قسمتی روی هم افتاده	دانه‌های تیره	✓ ترشح هیستامین در پاسخ به مواد حساسیت‌زا ✓ ترشح هپارین (ضد انعقاد خون)
اُئوزینوفیل	دو قسمتی دمبلی	دانه‌های روشن درشت	✓ مبارزه با عوامل بیگانه بزرگ‌تر مثل کرم‌های انگل ✓ محتویات دانه‌های خود را به روی انگل می‌ریزد.
نوتروفیل	چندقسمتی (بیش از ۲)	دانه‌های روشن ریز	✓ نیروهای واکنش سریع ✓ مواد دفاعی زیادی حمل نمی‌کنند و چابک‌اند. ✓ توانایی بیگانه‌خواری دارند.
مونوسیت	تکی خمیده یا لوبیایی	بدون دانه	✓ در جای‌جای بدن انسان ✓ در حبابک‌ها دیده می‌شود. ✓ در کبد و طحال به تخریب گلبول‌های قرمز می‌پردازد. ✓ در گره لنفی دیده می‌شود. ماکروفاژ ✓ از خون خارج می‌شوند و پس از خروج، تغییر می‌کند و به درشت‌خوار یا یاخته دندریتی تبدیل می‌شوند.
لنفوسیت	تکی گرد یا بیضی		✓ در پوست و لوله گوارش به فراوانی یافت می‌شود. ✓ در ارائه آنتی‌ژن به لنفوسیت‌ها نقش دارد. ✓ در گره لنفی دیده می‌شود. یاخته دندریتی
			✓ در مغز استخوان تولید و بالغ می‌شود. ✓ آنتی‌ژن سطح میکروب یا ذرات محلول مثل سم میکروب را شناسایی می‌کند. ✓ پس از شناسایی پادگن، به سرعت تقسیم می‌شود و پلاسموسیت را پدید می‌آورد. لنفوسیت B
			✓ در مغز استخوان تولید می‌شود. ✓ در تیموس بالغ می‌شود. ✓ یاخته‌های خودی را که تغییر کرده‌اند از بین می‌برد. ✓ به بخش پیوندشده حمله می‌کند. ✓ پس از شناسایی پادگن، تکثیر می‌شود و لنفوسیت T کشنده را ایجاد می‌کند. لنفوسیت T
			✓ یاخته‌های خودی را که تغییر کرده‌اند از بین می‌برد. ✓ همانند لنفوسیت T، پرفورین و آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده ترشح می‌کند. کشنده طبیعی

قطعات یاخته‌ای (نه یاخته) بی‌رنگ و بدون هسته‌ای که درون خود دانه‌های زیادی دارند و از گویچه‌های خون کوچکتر راند. این دانه‌ها، پر از ترکیبات فعال می‌باشند.	
گرده‌ها در مغز استخوان، زمانی تولید می‌شوند که یاخته‌های بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطعه‌قطعه و وارد جریان خون می‌شوند.	
در خون‌ریزی‌های محدود که دیوارهٔ رگ آسیب جزئی می‌بیند، گرده‌ها دورهم جمع می‌شوند، به هم می‌چسبند و ایجاد درپوش می‌کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگ آسیب‌دیده را می‌گیرد.	گرده‌ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.
در خون‌ریزی‌های شدیدتر، گرده‌ها در تولید لختهٔ خون ، نقش اصلی را دارند. آن‌ها با آزادکردن مواد و با کمک پروتئین‌های خونا ب مثل فیبرینوژن، لخته را ایجاد می‌کنند.	
بافت‌ها و گرده‌های آسیب دیده، آنزیم پروترومبیناز را به درون خون ترشح می‌کنند. این آنزیم سبب تبدیل پروترومبین (که از قبل در خونا ب وجود دارد) به ترومبین می‌شود. ترومبین نیز، فیبرینوژن (که از قبل در خونا ب وجود دارد) را به فیبرین تبدیل می‌کند. رشته‌های پروتئینی فیبرین، یاخته‌های خونی و پلاکت‌ها را در برمی‌گیرند و لخته را تشکیل می‌دهند.	
✓ وجود ویتامین K و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.	
✓ از بازوفیل‌ها ترشح می‌شود.	
✓ ضد انعقاد خون بوده و سبب جلوگیری از تشکیل لخته می‌شود.	نقش هپارین
✓ ممکنه طراح بیاد جور دیگه بیانش کنه! مثلاً بگه از تبدیل فیبرینوژن به فیبرین جلوگیری می‌کند.	
تشکیل لخته در مویرگ‌های قلب منجر به سکت قلبی می‌شود. پلاسمین، نوعی آنزیم بوده و لخته را در مویرگ‌هایی نظیر مویرگ‌های قلبی، ریوی و مغزی تجزیه می‌کند.	نقش پلاسمین
✓ پلاسمین می‌تواند سبب کاهش مقدار فیبرین شود.	
✓ پلاسمین کاربرد درمانی نیز دارد.	
✓ مدت زمان فعالیت پلاسمایی پلاسمین طبیعی، خیلی کوتاه است.	
✓ طبق متن کتاب پلاسمین سبب تجزیهٔ لخته در هر مویرگی نمی‌شود.	
✓ در این بیماری، فرآیند لخته شدن خون دچار اختلال می‌شود.	هموفیلی
✓ هموفیلی انواع مختلفی داشته و شایع‌ترین نوع هموفیلی به فقدان عامل انعقادی هشت (VIII) مربوط است.	

جمع‌بندی فرآیندهای تشکیل ادرار

تفاوت	✓ بخشی از خونا ب (به جز پروتئین‌ها) در نتیجه فشارخون از کلافک خارج شده و به کپسول بومن (نه مایع میان بافتی!) وارد می‌شوند.	
	✓ در تراوش، مواد فقط بر اساس اندازه وارد کپسول بومن می‌شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی‌گیرد.	
	آغاز و پایان	تراوش در کپسول بومن آغاز و در همین محل پایان می‌یابد.
	مصرف انرژی	به‌طور مستقیم انرژی مصرف نمی‌شوند و مواد به دلیل فشار تراوشی (باقی‌مانده فشارخون) از کلافک خارج می‌شوند.
	مویرگ‌های کلافک، منفذدار هستند و بنابراین امکان خروج مواد از آن‌ها به‌خوبی فراهم است.	
	✓ در مویرگ‌های منفذدار، منافذ فراوانی در غشای سلول‌های پوششی و غشای پایه‌ای ضخیم دیده می‌شود.	
	هم‌ساختار کلافک و هم‌ساختار کپسول بومن برای تراوش متناسب شده است.	کپسول بیرونی: یاخته‌های پوششی سنگفرشی ساده + غشای پایه ضخیم تر نسبت به غشای پایه دیواره درونی
بومن دو درونی: پودوسیت‌ها + غشای پایه نازک تر نسبت به غشای پایه دیواره بیرونی		
دیواره دارد		✓ هریک از پودوسیت‌ها با پاهای خود، مویرگ‌های کلافک را احاطه کرده‌اند.
✓ هسته پودوسیت‌ها نسبت به هسته سلول‌های دیواره بیرونی، بزرگ‌تر می‌باشد.		
✓ سلول‌های دیواره بیرونی، در امتداد سلول‌های مکعبی لوله پیچ‌خورده نزدیک قرار دارند.		

تراوش	برای اینکه فشار تراوشی (باقی مانده فشار خون در سمت سرخرگی) به حد کافی زیاد باشد، قطر سرخرگ آوران از وبران بیشتر است.	
بازجذب	آغاز	در تراوش هم مواد دفعی و هم مواد مفید به گردیزه وارد شده اند. مواد مفید مانند آمینواسیدها و گلوکز باید دوباره به خون بازگردند. این مواد از طریق مویرگ های دور لوله ای، دوباره جذب و به این ترتیب به خون وارد می شوند. این فرآیند در جهت مخالف تراوش و ترشح رخ می دهد. ✓ در فرد سالم همانند فرد دیابتی، گلوکز طی تراوش از خون خارج می شود.
	پایان	فرآیند بازجذب در نفرون ها، در لوله پیچ خورده دور به اتمام می رسد اما در مجاری جمع کننده نیز دیده می شود.
	مصرف انرژی	در بیشتر موارد بازجذب فعال است و با صرف انرژی صورت می گیرد؛ گرچه ممکن است غیرفعال نیز باشد مثل بازجذب آب (با اسمز)
	در جهت مخالف بازجذب رخ می دهد و در آن موادی که لازم است دفع شوند از مویرگ های دور لوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح می شوند. بعضی سموم و داروها به وسیله ترشح دفع می شوند. ✓ مقدار موادی که ترشح می شوند، نسبت به مقدار موادی که بازجذب می شوند، کمتر است.	
ترشح	آغاز	در لوله پیچ خورده نزدیک آغاز می شود.
	پایان	فرآیند ترشح در نفرون ها، در لوله پیچ خورده دور به اتمام می رسد اما در مجاری جمع کننده نیز دیده می شود.
	مصرف انرژی	در بیشتر موارد به روش فعال و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرند.
تغذیه	✓ چه زمانی مقدار نوعی ماده خاص در ادرار، از میزان تراوش شده آن بیشتر است؟ زمانی که علاوه بر تراوش، ترشح آن ماده نیز صورت گرفته باشد.	
	✓ چه زمانی مقدار نوعی ماده خاص در ادرار با میزان تراوش شده آن برابر است؟ زمانی که نه بازجذب و نه ترشح آن ماده صورت گرفته باشد.	
	✓ چه زمانی مقدار نوعی ماده خاص در ادرار از میزان تراوش شده آن کمتر است؟ زمانی که بخشی از ماده تراوش شده، بازجذب شده باشد.	
	✓ چه زمانی مقدار نوعی ماده خاص در ادرار صفر است؟ زمانی که اصلاً تراوش نشده باشد (مثل پروتئین ها) و یا همه آن بازجذب شده باشد (مثل گلوکز در فرد سالم)	

دیسه ها در گیاهان

دیسه چیست؟	یکی از ویژگی های یاخته گیاهی، داشتن اندامکی دو غشایی به نام دیسه (پلاست) است. این اندامک، دناى حلقوی و رناتن دارد و پروتئین سازی انجام می دهد. اگرچه، این اندامک نیازمند برخی پروتئین هایی است که ژن آن ها در هسته قرار دارد.	
انواع	کروموپلاست	در این دیسه، رنگیزه هایی به نام کاروتنوئیدها ذخیره می شوند. مثلاً رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج، مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی است. این دیسه ها، فاقد سبزینه می باشند.
	کلروپلاست	مقدار فراوانی سبزینه دارد. به همین علت گیاهان، سبز دیده می شوند. سبزدیسه ها، کاروتنوئید هم دارند که بارنگ سبزینه پوشیده می شود؛ در پاییز و با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه در بعضی (نه همه) گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شود. در این هنگام، سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد.
	امیلوپلاست	این دیسه ها رنگ ندارند؛ مثلاً در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به همین علت، به آن نشادیسه می گویند. ذخیره نشاسته، هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.

انواع رنگ‌ها در گیاهان	فقط بعضی از رنگ‌ها در گیاهان مربوط به ترکیبات رنگی در واکوئل‌ها است مثلاً ریشهٔ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه‌هایی مانند پرتقال توسرخ
	رنگ سبز در گیاهان به دلیل داشتن اندامکی به نام سبز دیسه می باشد.
	برخی رنگ‌ها نظیر رنگ زرد ریشهٔ هویج یا رنگ قرمز میوهٔ گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات درون رنگ دیسه‌ها یا کروموپلاست‌ها می باشد

جمع بندی مریستم‌ها

انواع مریستم‌ها	مریستم‌های نخستین	مریستم‌های پسین
یاخته‌های مریستمی در نوک ساقه و ریشه، یاخته‌های مریستمی وجود دارند که دائماً تقسیم می شوند (G_1 کوتاه) و یاخته‌های مورد نیاز برای ساختن سامانه‌های بافتی را تولید می کنند. یاخته‌های مریستمی به طور فشرده قرار می گیرند و فاصلهٔ بین سلولی کمی دارند. هستهٔ درشت آن‌ها در مرکز یاخته قرار داشته و بیشتر حجم سلول را به خود اختصاص می دهند. این سلول‌ها، واکوئل‌های کوچکی دارند.	ریشه ✓ نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد؛ پس در نوک ریشه قرار ندارد. ✓ با بخش زنده و انگشتانه ماندی به نام کلاهک پوشیده می شود. کلاهک ترکیبات پلی ساکارییدی ترشح می کند که سبب لزج شدن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود. یاخته‌های سطح بیرونی کلاهک به طور مداوم می ریزند و با یاخته‌های جدید، جانشین می شوند. ✓ کلاهک، مریستم نزدیک به نوک ریشه را در برابر آسیب‌های محیطی، حفظ می کند.	کامبیوم چوب آبکش (آوند ساز) ✓ منشأ بافت‌های آوند چوب و آبکش در ساقه و ریشه ✓ بین آوند چوب و آبکش نخستین تشکیل می شود. ✓ آوند چوب پسین را به سمت داخل تولید می کند. ✓ آوند آبکش پسین را به سمت بیرون تولید می کند. ✓ مقدار بافت آوند چوبی تولیدی توسط این مریستم، از آبکش بیشتر است. ✓ نسبت به کامبیوم چوب پنبه ساز، داخلی تر است.
	ساقه ✓ عمدتاً در جوانه‌ها قرار دارند. جوانه‌ها مجموعه‌ای از یاخته‌های مریستمی و برگ‌های بسیار جوان اند. رشد جوانه‌ها علاوه بر افزایش طول ساقه، به ایجاد شاخه‌ها و برگ‌های جدیدی نیز می انجامد. جوانه‌ها را بر اساس محل قرارگیری، به دو گروه جوانهٔ رأسی و جوانهٔ جانبی تقسیم می کنند. برخی مریستم‌ها در جوانه‌ها قرار ندارد و در فاصلهٔ بین دو گره در ساقه یا شاخه مستقر شده اند. گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل شده است.	
	نتیجهٔ فعالیت این مریستم‌ها، افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. همچنین برگ‌ها و انشعاب‌های جدید ساقه و ریشه از فعالیت این مریستم‌ها تشکیل می شوند. ساختار نخستین گیاه در پی فعالیت این مریستم‌ها شکل می گیرد و به همین دلیل، به آن‌ها، مریستم‌های نخستین می گویند. تشکیل ساقه و ریشه‌هایی با قطر بسیار در نهان دانگان دولپه‌ای نمی تواند حاصل فعالیت مریستم‌های نخستین در این گیاهان باشد. به مریستم‌هایی که در افزایش ضخامت (قطر) نقش دارند، مریستم پسین می گویند. دو نوع مریستم به نام کامبیوم آوند ساز و کامبیوم چوب پنبه ساز در گیاهان دولپه‌ای وجود دارد.	
		کامبیوم چوب پنبه ساز ✓ در سامانهٔ بافت زمینه‌ای ساقه و ریشه تشکیل می شود. ✓ یاخته‌های پارانشیمی را به سمت درون تولید می کند. ✓ به سمت بیرون، یاخته‌هایی را می سازد که دیوارهٔ آن‌ها به تدریج، چوب پنبه‌ای می شود و در نتیجه بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشکیل می دهد. چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی و نسبت به آب و گاز نفوذناپذیر است. بافت چوب پنبه، بافتی مرده است.

انواع مرسته ها	کامبیوم چوب پنبه ساز	کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع، پیراپوست را تشکیل می دهند. پیراپوست در اندام های مسن گیاه، جانشین روپوست می شود. پیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها نفوذ ناپذیر است، در حالیکه بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند. به همین علت در پیراپوست، برجستگی هایی به نام عدسک ایجاد می شود. در این مناطق، یاخته ها از هم فاصله دارند و امکان تبادل گازها را فراهم می کنند.
	پوست درخت	پوست درخت، مجموعه ای از لایه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. با کندن پوست درخت، کامبیوم آوند ساز در معرض آسیب های محیطی قرار می گیرد.

همزیست های گیاهان

قارچ ریشه ای	✓ یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشه گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن قارچ ریشه ای گفته می شود. ✓ حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار (نهان دانه + باز دانه) با قارچ ها همزیستی دارند. ✓ این قارچ ها در سطح ریشه زندگی می کنند. رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستند که تبادل مواد را با آن انجام می دهند. ✓ در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشه گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند. پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ ها، نسبت به ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند. ✓ غلاف قارچ ریشه، نوک ریشه را به طور کامل پوشانده است. ✓ ارسال رشته های ظریف به درون ریشه توسط قارچ ریشه، در نوک ریشه دیده نمی شود.
تثبیت کننده های نیتروژن	از گذشته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام می شد که در آن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی کشت می شد. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد استفاده قرار می گیرد، گیاهان تیره پروانه واران است (دلیل این نام گذاری، شباهت گل های آن ها به پروانه است). سویا، نخود و یونجه از گیاهان مهم زراعی این تیره هستند. ✓ گل های تیره پروانه واران (نه برگ ها!) به پروانه شبیه می باشد. ✓ با استفاده از زیست فناوری، برخی گیاهان تیره پروانه واران مثل سویا به باکتری مقاوم شده اند. در ریشه این گیاهان و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می کند. هنگامی که این گیاهان می میرند یا بخش های هوایی آن ها برداشته می شود، گرهک های آن ها در خاک باقی می ماند و گیاه خاک غنی از نیتروژن ایجاد می کند. ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم می کند. سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتز کننده هستند که بعضی از آن ها می توانند علاوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. ✓ هر سیانوباکتری فتوسنتز می کند؛ اما هر سیانوباکتری تثبیت نیتروژن انجام نمی دهد. آزولا گیاهی کوچک است که در تالاب های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد. گیاه آزولا با سیانوباکتری ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می کند سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند. ✓ سیانوباکتری ها می توانند در بخش های هوایی گیاه نیز قرار داشته باشند؛ مثل ساقه و دمبرگ گیاه گونرا
گیاهان انگل	انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند. ✓ برخی گیاهان انگل می توانند فتوسنتز انجام دهند و تنها بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهی دیگر دریافت کند. گیاه سس، نمونه ای از این گیاهان است. این گیاه ساقه نارنجی یا زرد رنگی تولید می کند که فاقد ریشه است. گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد و اندام های مکنده ایجاد می کند که به درون آوندهای گیاه نفوذ و مواد مورد نیاز انگل را جذب می کند. ✓ در گیاه سس، رشد یاخته ها در محل تماس با گیاه میزبان کاهش می یابد. ✓ اندام های مکنده گیاه سس به درون آوندهای گیاه وارد می شود. گل جالیز نمونه دیگری از این گیاهان است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می کند ✓ گل جالیز برخلاف سس، اندام مکنده خود را به ریشه گیاه می فرستد.

انبوهی از مورچه‌ها به حشره‌ای که قصد خوردن برگ‌های درخت آکاسیا را دارد، هجوم برده‌اند. دیده شده است که این مورچه‌ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی نیز حمله می‌کنند. گیاهان دارزی، گیاهانی‌اند که روی درختان رشد می‌کنند. این مورچه‌ها در حقیقت از محل زندگی خود محافظت می‌کنند.

بعضی گیاهان در برابر حمله گیاه‌خواران، مواد فراری تولید و در هوا پخش می‌کنند که سبب جلب جانوران دیگر می‌شود. هنگامی که برگ‌های درخت تنباکو توسط نوزاد کرمی شکل خورده می‌شود؛ از یاخته‌های آسیب‌دیده برگ، ترکیب فراری متصاعد می‌شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می‌کند. زنبور ماده‌ای که در آن اطراف زندگی می‌کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی شکل می‌رساند و روی آن تخم می‌گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می‌کنند و در نتیجه آن را می‌کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت و افزایش جمعیت زنبور وحشی است.

جمع‌بندی انتقال از خاک به برگ و بررسی حرکت شیره پرورده

مسیر کوتاه	انتقال مواد در سطح یاخته‌ای	✓ در این حالت، جابه‌جایی مواد با فرایندهای فعال و غیرفعال و در حد یاخته انجام می‌شود. شیوه‌هایی مثل انتشار و انتقال فعال، نمونه‌هایی از این روش‌هاست. ✓ برای انتقال آب در عرض غشای بعضی یاخته‌های گیاهی و جانوری و غشای واکوئل بعضی یاخته‌های گیاهی، پروتئین‌هایی عبور آب در غشا دخالت دارند که سرعت جریان آب را افزایش می‌دهند. ✓ هنگام کم‌آبی، ساخت این پروتئین‌ها تشدید می‌شود؛ یعنی هنگام کم‌آبی، رونویسی و ترجمه ژن این پروتئین‌ها افزایش می‌یابد. ✓ پروتئین‌های افزایش‌دهنده سرعت عبور آب، در غشای واکوئل‌های جانوری دیده نمی‌شوند. ✓ پروتئین‌های افزایش‌دهنده سرعت عبور آب در غشای یاخته‌ای هر یاخته گیاهی یا جانوری دیده نمی‌شود.
	انتقال از عرض غشا	✓ انتقال عرض غشایی شامل جابه‌جایی مواد از عرض غشای یاخته است. ✓ در این روش، آب از دیواره یاخته‌ها و غشای آن‌ها عبور می‌کند.
	انتقال مواد در عرض ریشه که به سه روش دیده می‌شود.	✓ سیمپلاست به معنی پروتوپلاست همراه با پلاسمودسم‌ها است. ✓ انتقال سیمپلاستی حرکت مواد از پروتوپلاست یک یاخته به یاخته مجاور، از راه پلاسمودسم‌هاست. آب و بسیاری از مواد محلول می‌تواند از فضای پلاسمودسم به یاخته‌های دیگر منتقل شود. ✓ منافذ پلاسمودسم آن قدر بزرگ است که پروتئین‌ها، نوکلئیک‌اسیدها و حتی ویروس‌های گیاهی از آن عبور می‌کنند.
مسیر بلند	انتقال آپوپلاستی	✓ در مسیر آپوپلاستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته‌ای و دیواره یاخته‌ای انجام می‌شود. ✓ عبور آب از این مسیر اسمز محسوب نمی‌شود؛ زیرا از غشای یاخته‌ای عبور نمی‌کند. ✓ به دلیل عدم اسمز در این مسیر، فشار اسمزی نقشی در تعیین مسیر مواد ندارد. ✓ در مسیر آپوپلاستی، نیروی هم‌چسبی میان مولکول‌های آب در تعیین جهت حرکت مواد نقش دارد.
	فشار ریشه‌ای	✓ یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده پیرامون آوندهای ریشه، با انتقال فعال (مصرف انرژی)، یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می‌کنند. این عمل باعث افزایش مقدار این یون‌ها، افزایش فشار اسمزی و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی می‌شود. در اثر تجمع آب و یون‌ها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می‌یابد و فشار ریشه‌ای را ایجاد می‌کند. فشار ریشه‌ای باعث هل دادن شیره خام به سمت بالا می‌شود. ✓ در بیشتر گیاهان (نه همه آن‌ها)، فشار ریشه‌ای در صعود شیره خام نقش کمی دارد. ✓ در برخی گیاهان، فشار ریشه‌ای در صعود شیره خام، نقش زیادی دارد
	فشار ریشه‌ای	

مسیر بلند	تعرق	✓ عامل اصلی انتقال شیرهٔ خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می‌شود. ✓ علت تعرق نیز حرکت آب از محل دارای آب بیشتر به محل با آب کمتر است. ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی‌های هم چسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب است ✓ بیشتر (نه همه!) تعرق گیاهان از روزنه‌های برگ انجام می‌شود. نیروی مکش تعرق آنقدر زیاد است که در یک روز گرم می‌تواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود؛ هرچند این کاهش اندک است. اگر دیواره آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به راحتی در اثر مکش تعرق، له می‌شد.
چگونگی حرکت شیرهٔ پرورده	حرکت شیره پرورده از طریق سیتوپلاسم یاخته‌های زنده آبکشی و از یاخته ای به یاخته دیگر انجام می‌شود؛ بنابراین حرکت شیره پرورده از شیر خام کندتر و پیچیده‌تر است. یک گیاه شناس آلمانی به نام ارنست مونش، الگوی جریان فشاری را برای جابه جایی شیره پرورده، ارائه داده است که ۴ مرحله دارد: ۱ قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته‌های آبکش می‌شوند. (بارگیری آبکشی) ۲ با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، فشار اسمزی یاخته‌های آبکشی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، آب از یاخته‌های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می‌شود. ۳ در یاخته‌های آبکشی، فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیر، پرورده به صورت توده ای از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر (محل مصرف) به حرکت درمی‌آید. ۴ در محل مصرف، مواد آلی شیره پرورده، با انتقال فعال، باربرداری (باربرداری آبکشی) و آنجا مصرف یا ذخیره می‌شوند؛ در نتیجه، آب از آوند آبکش خارج شده و به آوند چوبی می‌رود. ✓ در گیاهان دوساله، ریشه در سال اول و دوم، به ترتیب محل مصرف و محل منبع می‌باشد.	

جمع بندی پتانسیل عمل

تغییر ناگهانی پتانسیل غشا و سپس بازگشت به آرامش را پتانسیل عمل می گویند که از ۳ مرحله تشکیل شده است:

از ۷۰- تا ۳۰+	از ۳۰- تا ۷۰-
در ابتدای آن کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند	در ابتدای آن کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند
نفوذپذیری غشا به یون سدیم افزایش می یابد.	نفوذپذیری غشا به یون پتاسیم افزایش می یابد.
در انتهای آن، کانال های دریچه دار سدیمی بسته می شوند.	در انتهای آن، کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند.
✓ به علت فعالیت کانال های ناشی، همواره سدیم به سلول وارد و پتاسیم از آن خارج می شود.	✓ به علت فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم، همواره سدیم از سلول خارج و پتاسیم به سلول وارد می شود.
✓ همواره، مقدار سدیم بیرون از درون و مقدار پتاسیم درون از بیرون بیشتر می باشد.	✓ شیب غلظت سدیم همواره به سمت درون سلول و پتاسیم به سمت بیرون سلول می باشد.
✓ پمپ سدیم- پتاسیم، کانال های ناشی و دریچه دار توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپلاسمی تولید می شود.	✓ در پتانسیل عمل، برای مدتی، داخل یاخته از بیرون مثبت تر (مجموع یون سدیم و پتاسیم) می شود.
✓ در پتانسیل عمل همانند پتانسیل آرامش، سدیم بیرون از درون پ و پتاسیم درون از بیرون بیشتر می باشد.	✓ بازگشت غشا به پتانسیل آرامش ناشی از باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی می باشد و نه پمپ سدیم- پتاسیم!
✓ دریچه کانال دریچه دار سدیمی در سمت بیرون غشا قرار گرفته است.	✓ دریچه کانال دریچه دار پتاسیمی در سمت داخل غشا قرار گرفته است.
✓ در پایان پتانسیل عمل، غلظت یون ها (و نه شیب غلظت آن ها) در دو سوی غشا باحالت آرامش تفاوت دارد.	✓ در قله پتانسیل عمل، برای لحظه ای کوتاه، هردو نوع کانال دریچه دار بسته می باشند.
✓ در صورت کاهش نفوذپذیری غشا به پتاسیم، پتانسیل آرامش، مثبت تر می شود.	

مغز

بخش‌های مختلف: مغز از سه بخش اصلی، مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است.

مخ

مخچه

ساقه مغز

مغز میانی

پل مغزی

بصل النخاع

تالاموس‌ها

زیرنهنج

لیمبیک

هیپوفیز

استخوان‌های مجامه

سه پرده از بافت پیوندی

به نام پرده‌های مننژ

حفاظت

- ✓ دو نیم کره آن بیشتر حجم مغز را تشکیل داده و با رشته‌هایی میلیون دار به هم متصل اند. رابط‌های پینه‌ای و سه گوش از این رشته‌های عصبی‌اند؛ یعنی به غیر از این دو تا رشته، رشته‌های دیگری هم یافت می‌شوند.
- ✓ دو نیم کره به‌طور هم‌زمان از همه بدن اطلاعات را دریافت و پردازش می‌کند تا بخش‌های مختلف بدن به‌طور هماهنگ فعالیت کنند. شیارهای عمیق (نه هر شیار!) قشر مخ، هر نیم کره را به چهار لوب پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و پس‌سری تبدیل می‌کند. همچنین قشر مخ شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی است. قشر مخ جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز است که نتیجه آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.
- ✓ لوب‌های پیشانی و پس‌سری (جلویی‌ترین و عقبی‌ترین لوب‌ها) در هر نیم کره، با دو لوب دیگر مرز مشترک دارند.
- ✓ لوب‌های آهیانه و گیجگاهی در هر نیم کره، با سه لوب دیگر مرکز مشترک دارند.

- ✓ در پشت ساقه مغز و شامل دو نیم کره و بخشی به‌نام کریمینه در وسط آن‌هاست.
- ✓ مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل بدن است که به‌طور پیوسته از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی مثل گوش‌ها پیام دریافت می‌کند. در بخش‌های درونی آن ساختارهای میلیون دار یافت می‌شود.
- ✓ با دو لوب پس‌سری و گیجگاهی در تماس می‌باشد.

- ✓ در شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارد و شامل برجستگی‌های چهارگانه می‌باشد.
- ✓ در تنفس و ترشح بزاق و اشک نقش دارد و از مراکز هماهنگی اعصاب خودمختار است.
- ✓ پایین‌ترین بخش مغز که در بالای نخاع قرار گرفته فشارخون و زنبق قلب را تنظیم می‌کند. مرکز انعکاس‌هایی مثل عطسه، سرفه و بلع و مرکز اصلی تنفس است.
- ✓ از مراکز هماهنگی اعصاب خودمختار می‌باشد.
- ✓ از بخش‌های دیگر مغز مثل پل مغزی می‌تواند پیام عصبی دریافت کند.

- ✓ محل پردازش اولیه و تقویت اغلب (نه همه) اطلاعات حسی و فرستادن به محل پردازش نهایی
- ✓ تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشارخون، تشنگی، گرسنگی و خواب و ترشح برخی هورمون‌ها
- ✓ گیرنده‌های شیمیایی دارد.
- ✓ با قشر مخ، هیپوتالاموس و تالاموس در ارتباط است و در ایفای احساسات مثل ترس، خشم و لذت نقش دارد.
- ✓ دوپامین نیز ترشح می‌کند.
- ✓ در یک گودی از استخوانی از کف مجامه جای گرفته است.
- ✓ بخش پیشین آن (بزرگ‌ترین بخش)، شش هورمون را تولید و ترشح می‌کند.
- ✓ بخش پسین آن، دو هورمون تولید شده در هیپوتالاموس را ترشح می‌کند.

- لایهٔ خارجی که چسبیده به استخوان است.
- لایهٔ میانی
- لایهٔ داخلی که به بخش خارجی مغز (مادهٔ خاکستری) چسبیده است.
- در فضای بین پرده‌ها نوعی مایع ضربه‌گیر به نام مایع مغزی نخاعی وجود دارد
- در شیارهای عمیق نظیر شیار بین دو نیم‌کره هر سه لایه وجود دارند اما در چین‌خوردگی‌های قشر مخ فقط لایه داخلی پرده مننژ وجود دارد.

- سلول‌های بافت پوششی مویرگ‌های مغز و نخاع به هم دیگر چسبیده‌اند و بین آن‌ها منفذی وجود ندارد.
- سد خونی - مغزی
- بسیاری (نه همه) از مواد و میکروب‌ها نمی‌توانند به مغز وارد شوند؛ البته برخی مولکول‌ها مثل اکسیژن، گلوکز و آمینواسیدها و برخی داروها می‌توانند از این سد عبور کنند.

بخش حرکتی دستگاه عصبی		
✓ پیام عصبی را به ماهیچه‌های اسکلتی می‌رساند. فعالیت این ماهیچه‌ها به شکل ارادی یا غیرارادی انجام می‌شود. ✓ فعالیت ماهیچه‌های اسکلتی می‌تواند به شکل انعکاسی نیز تنظیم شود. انعکاس پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه‌ها در پاسخ به محرک‌هاست. ✓ بخش پیکری همانند بخش خودمختار می‌تواند سبب انقباض غیرارادی ماهیچه‌ها گردد.		
پیکری	حسی با رابط اول (تحریکی)	سیناپس‌های نخاعی (در ماده خاکستری قرار دارند و همگی فعال‌اند)
	رابط اول با حرکتی دو سر (تحریکی)	
	حسی با رابط دوم (تحریکی)	
	رابط دوم با حرکتی سه سر (مهارتی)	
	حرکتی اول با ماهیچه دو سر (تحریکی)	سیناپس‌های خارج نخاعی
	حرکتی دوم با ماهیچه سه سر (غیرفعال)	
✓ هیچ ناقلی در سیناپس نوروون حرکتی با ماهیچه سه سر آزاد نمی‌شود. ✓ در سیناپس فعال، قطعاً نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی تغییر می‌کند. ✓ یاخته پس سیناپسی می‌تواند گلوکز را به شکل بی‌هوازی تجزیه کند؛ زیرا می‌تواند ماهیچه باشد. ✓ یاخته پیش‌سیناپسی نمی‌تواند گلوکز را به شکل بی‌هوازی تجزیه کند؛ زیرا همواره نوروون است.		
کار ماهیچه‌های صاف، قلبی و غدد را به‌طور ناآگاهانه تنظیم می‌کند و همواره فعال است. پس اگر تو تستی بهت گفت با فعال شدن مثلاً بخش سیمپاتیک اشتباهه و باید غلط بگیریش!		
خودمختار	بخش هم حس (سمپاتیک)	از دو بخش تشکیل شده که معمولاً (نه همیشه) برخلاف یکدیگر عمل می‌کنند تا فعالیت‌های حیاتی بدن را در شرایط مختلف تنظیم کنند.
	بخش پادهم حس (پاراسمپاتیک)	
	فعالیت پاراسمپاتیک	✓ برقراری حالت آرامش در بدن می‌شود؛ مثلاً فشارخون کاهش یافته و ضربان قلب کم می‌شود. ✓ همچنین این بخش سبب تنگ شدن مردمک با انقباض ماهیچه‌های حلقوی می‌شود.
	فعالیت سمپاتیک	✓ هنگام هیجان بر بخش پاراسمپاتیک غلبه دارد و باعث افزایش فشارخون، ضربان قلب و تعداد تنفس شده و جریان خون را به‌سوی قلب و ماهیچه‌های اسکلتی هدایت می‌کند. ✓ همچنین این بخش سبب گشادشدن سوراخ وسط عنبیه با انقباض ماهیچه‌های شعاعی می‌گردد.
	✓ مرکز هماهنگی این اعصاب در بصل‌النخاع و پل مغزی قرار گرفته و همکاری این مراکز نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص تأمین می‌کند. ✓ بر عملکرد شبکه‌های سلول‌های عصبی روده‌ای اثر می‌گذارد.	

پاسخ التهابی	
نشانه‌ها	قرمزی + تورم + گرما + درد
تعریف	التهاب، پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می‌کند. این پاسخ به: ۱ از بین بردن میکروب‌ها ۲ جلوگیری از انتشار میکروب‌ها ۳ و تسریع بهبودی منجر می‌شود.
بروز التهاب	در التهاب از ماستوسیت‌های آسیب‌دیده، هیستامین رها می‌شود. به این ترتیب گویچه‌های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می‌شوند و خوناب بیشتری به بیرون نشت می‌کند. یاخته‌های دیواره مویرگ‌ها و درشت‌خوار با تولید پیک‌های شیمیایی، گویچه‌های سفید خون را به محل آسیب فرامی‌خوانند. نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها با تراگذاری از خون خارج می‌شوند. نوتروفیل‌ها بیگانه‌خواری می‌کنند و مونوسیت‌ها ابتدا به ماکروفاژ تبدیل می‌شوند و سپس بیگانه‌خواری می‌کنند.

نقشه	وراثت و محیط هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند. پروتئین‌ها (تنظیم‌کننده چرخه سلول و مرگ آن) محصول عملکرد ژن‌ها هستند؛ بنابراین مشخص است که در ایجاد سرطان ژن‌ها نقش دارند. ژن‌های زیادی شناخته‌شده که در بروز سرطان موثراند.
	✓ علت شیوع بیشتر برخی سرطان‌ها در بعضی جوامع همین مسئله است.
	✓ عوامل محیطی مثل پرتوهای فرابنفش، بعضی آلاینده‌های محیطی و دود خودروها به ساختار دنا آسیب می‌زند. سایر پرتوها و مواد شیمیایی سرطان‌زا، مصرف زیاد مواد غذایی نمک‌سود یا دودی یا کباب‌شده یا سرخ‌شده، برخی ویروس‌ها، قرص‌های ضدبارداری، نوشیدنی‌های الکلی (مصرف بلندمدت) و دخانیات از عوامل مهم سرطان‌زایی‌اند.
پیشگیری	✓ ترکیبات نیتريت‌دار در بدن به ترکیباتی تبدیل می‌شوند که تحت شرایطی قابلیت سرطان‌زایی دارند.
	✓ همچنین رادیکال‌های آزاد از عوامل ایجاد سرطان‌اند.
	✓ چاقی سلامت فرد را به خطر می‌اندازد و احتمال ابتلا به انواعی از سرطان را افزایش می‌دهد.
پیشگیری	✓ ترکیباتی که در گیاهان ساخته می‌شود در مقادیر متفاوت ممکن است سرطان‌زا، مسموم‌کننده و حتی کشنده باشد.
	✓ بنزوپیرن موجود در دود سیگار یک ماده شیمیایی جهش‌زاست که به سرطان منجر می‌شود.
	✓ عامل نارنجی (مخلوط از اکسین‌ها) سرطان‌زا می‌باشد.
پیشگیری	✓ مصرف تنباکو ارتباط مستقیمی با سرطان‌های دهان، حنجره و شش دارد.
	✓ ترکیبات رنگی در کریچه و کروموپلاست، پاداکسنده‌اند. ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان و بهبود کارکرد مغز و اندام‌های دیگر نقش مثبتی دارند.
	✓ سبک زندگی و تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارد.

جمع‌بندی وقایع لقاح

تخمک‌گذاری	اووسیت ثانویه پس از تخمک‌گذاری از طریق شیپور فالوپ وارد لوله رحم می‌شود. حرکات زوائد انگشت‌مانند، انقباض دیواره و زنش مژک‌های دیواره لوله رحم ، اووسیت ثانویه را به سمت رحم حرکت می‌دهند.
	میلیون‌ها اسپرم به سمت اووسیت شنا می‌کنند اما فقط تعداد کمی از آن‌ها در لوله رحم به آن می‌رسند.
	اسپرم برای ورود به اووسیت باید از دولایه خارجی و داخلی اطراف آن عبور کنند.
ورود مایع منی	لایه خارجی ← باقی‌مانده سلول‌های فولیکولی
	لایه داخلی ← لایه‌های شفاف و ژله‌ای
	اسپرم با فشار از بین سلول‌های فولیکولی عبور می‌کند و در حین عبور، کیسه آکروزوم پاره می‌شود تا آنزیم‌های آن لایه داخلی را هضم کنند.
شروع لقاح	✓ شروع لقاح زمانی است که غشای اسپرم با غشای اووسیت ثانویه تماس پیدا کند.
	✓ در این زمان ضمن ادغام غشاها (افزایش تعداد فسفولیپیدهای غشایی)، تغییراتی در سطح اووسیت می‌افتد که باعث ایجاد پوششی به‌نام جدار لقاحی می‌شود. این جدار پیش از تکمیل میوز و در پی آگزوسیتوز و زیکول‌هایی حاوی مواد سازنده جدارلقاحی تشکیل می‌گردد.
	✓ هسته زامه وارد مام‌یاخته ثانویه شده و با هسته آن ادغام می‌گردد.
تکمیل لقاح	✓ دقت کنید میتوکندری‌های اسپرم وارد اووسیت ثانویه نمی‌شوند!
	✓ زیکول‌های حاوی مواد سازنده جدار لقاحی، از قبل و پیش از ورود مایع منی، ساخته شده‌اند .
	با ورود سر زامه به مام یاخته، هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد می‌شود. در همین حال، مام‌یاخته ثانویه کاستمان را تکمیل کرده و به تخمک تبدیل می‌شود. هسته تخمک با هسته زامه ادغام می‌شود و یاخته تخم با ۲۳ جفت فام‌تن شکل می‌گیرد.

بلاستوسیت	لایه‌های بلاستوسیت	مورولا به سمت ابتدای لوله‌های فالوپ حرکت می‌کند و پس از رسیدن به رحم، به شکل کره‌ای توخالی درآمده و درون آن با مایعات پر می‌شود که به آن بلاستوسیت می‌گویند. ✓ یک لایه بیرونی به نام تروفوبلاست (در تماس با مایع بلاستوسیت) دارد که در مراحل بعدی برون‌شامه جنین را تشکیل می‌دهد. کوریون به همراه بخشی (نه همه) از دیواره رحم جفت را می‌سازد. جفت رابط بین بند ناف و رحم است. ✓ در ادامه از سلول‌های تروفوبلاست، آنزیم‌های هضم‌کننده‌ای ترشح می‌شود → تخریب سلول‌های جدار رحم و ایجاد حفره‌ای برای جای گرفتن بلاستوسیت. این فرآیند جایگزینی نام دارد. ✓ سلول‌های جنینی، مواد مغذی مورد نیاز خود را ابتدا از اندوخته غذایی تخمک و سپس از بافت‌های هضم شده توسط آنزیم‌های تروفوبلاست به دست می‌آورند. ✓ سلول‌های درون بلاستوسیت، توده سلولی درونی را تشکیل می‌دهند. این سلول‌ها حالتی بنیادی دارند و منشأ بافت‌های مختلف تشکیل دهنده جنین هستند. هم‌زمان با تشکیل جفت، یاخته‌های توده درونی لایه‌های زاینده جنینی (سه عدد) را تشکیل می‌دهند که هر کدام منشأ بافت‌ها و اندام‌های مختلف‌اند. ✓ سلول‌های بنیادی → سلول‌هایی تخصص نیافته که توانایی تبدیل شدن به سلول‌های متفاوتی را دارند.
		✓ بعد از جایگزینی، پرده‌های محافظت‌کننده در اطراف جنین تشکیل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها درون‌شامه (آمنیون) و برون‌شامه (کوریون) هستند. آمنیون در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد؛ و مایع آمنیوتیک درون کیسه آمنیون قرار دارد. ✓ کوریون در تشکیل جفت و بندناف دخالت دارد، پس هم کوریون و هم آمنیون در تغذیه و حفاظت جنین نقش دارند. ✓ تعداد پرده‌های محافظت‌کننده جنینی قطعا بیشتر از دو عدد می‌باشد. ✓ منشأ کوریون: تروفوبلاست ✓ منشأ آمنیون: توده درونی
کنترل ورود و خروج مواد در جفت		✓ تمایز جفت از هفته دوم بعد از لقاح (نه دو هفته بعد) شروع می‌شود اما تا هفته دهم ادامه دارد؛ یعنی تکمیل تمایز جفت حتی پس از آغاز ضربان قلب می‌باشد. خون مادر و جنین در جفت به دلیل پرده کوریون مخلوط نمی‌شود اما تبادل مواد بین دو طرف این پرده می‌تواند صورت بگیرد. ✓ مواد مغذی (نظیر گلوکز) و برخی پادتن‌ها (ایمنی غیرفعال) از طریق جفت به جنین منتقل می‌شوند تا جنین تغذیه و محافظت گردد و مواد دفعی جنین نیز از همین طریق به خون مادر منتقل می‌شوند. ✓ درعین حال عوامل بیماری‌زا و موادی مثل نیکوتین، کوکائین و الکل نیز می‌توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین اثر سوء بگذارند.

هورمون‌های گیاهی

محرك‌های رشد	اکسین‌ها	✓ اکسین به معنای رشد کردن است. ✓ اولین تنظیم‌کننده گیاهی که ساختار آن کشف شد. ✓ در نورگرایی (رشد جهت‌دار اندام گیاه در پاسخ به نور یک‌جانبه) مؤثر است. ✓ ریشه‌زایی را تحریک می‌کند؛ بنابراین در قلمه‌زدن (نوعی تکثیر رویشی) به کار می‌رود. ✓ با تحریک رشد طولی یاخته‌ها (افزایش سیتوپلاسم)، سبب رشد ساقه می‌شود. ✓ سبب تشکیل میوه‌های بدون دانه، تحریک رشد تخمدان و درشت کردن میوه‌ها می‌شود. ✓ در چیرگی رأسی مؤثر است و سبب توقف رشد جوانه جانبی از طریق افزایش غلظت اتیلن در جوانه جانبی می‌شود. ✓ بالا بودن مقدار آن نسبت به سیتوکینین سبب تشکیل ریشه از یاخته‌های تمایز نیافته در فن کشت بافت می‌شود. ✓ برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره را تولید می‌کند. ✓ بعضی اکسین‌ها سبب از بین رفتن گیاهان دولپه‌ای می‌شوند. ✓ بعضی اکسین‌ها مثل عامل نارنجی، می‌توانند سبب ایجاد سرطان در انسان شوند.
--------------	----------	--

محرك‌های رشد	سیتو کینین‌ها	✓ از آن به عنوان هورمون جوانی نام برده می‌شود. ✓ سیتو کینین‌ها، هورمون ساقه‌زایی نیز نامیده می‌شوند؛ زیرا: ✓ بالا بودن مقدار آن نسبت به اکسین سبب تشکیل ساقه از یاخته‌های تمایز نیافته در فن کشت بافت می‌شود. ✓ سبب تحریک تقسیم یاخته‌ای در اندام‌های هوایی گیاه می‌شود؛ در نتیجه: ✓ باعث تأخیر در پیر شدن اندام‌های هوایی گیاه می‌شود. ✓ از طریق روپوست برگ‌ها و گل‌ها جذب می‌شود. ✓ با قطع جوانه رأسی، مقدار آن در جوانه جانبی افزایش می‌یابد.
	جبرلین‌ها	✓ حین بررسی نوعی بیماری قارچی کشف شد. ✓ در جاندارانی غیر از گیاهان نظیر قارچ‌ها نیز تولید می‌شوند. ✓ سبب رشد ساقه از طریق تحریک رشد طولی و تحریک تقسیم یاخته‌ای می‌شود. ✓ سبب رشد میوه، تولید میوه‌های بدون دانه و درشت کردن میوه‌ها می‌شود. ✓ سبب رویش دانه می‌گردد. ✓ مقادیر فراوانی از آن، حین رویش دانه‌های غلات از رویان ترشح شده و بر روی خارجی‌ترین لایه آندوسپرم (لایه گلوتن‌دار) تأثیر می‌گذارد.
بازدارنده‌های رشد	آبسیزیک اسید	✓ در مقابله گیاه با شرایط نامساعد نقش دارد و تولید آن در شرایط نامساعد مثل خشکی، تحریک می‌شود. ✓ سبب بستن روزنه‌های هوایی (نه آبی!) گیاه می‌شود. ✓ مانع رویش دانه (مخالف جبرلین) و جوانه‌ها شده و به‌طور کلی، رشد گیاه را در شرایط نامساعد کاهش می‌دهد.
	اتیلین	✓ حضور جوانه رأسی، تولید اتیلین در جوانه جانبی را تحریک می‌کند و در نتیجه، رشد جوانه جانبی متوقف می‌شود. ✓ باعث ریزش برگ درختان و ریزش میوه‌ها می‌شود. ✓ بافت‌های آسیب‌دیده گیاهی نیز اتیلین تولید می‌کنند. ✓ از میوه‌های رسیده آزاد می‌شود و مقدار اتیلین، با رسیدن میوه افزایش می‌یابد. ✓ برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلین به اکسین، آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره را تولید می‌کند. ✓ گیرنده‌های آن در درون سلول قرار دارند.
	سالیسیلیک اسید	✓ در مرگ یاخته‌ای نقش دارد؛ یاخته گیاهی آلوده، این ترکیب را رها و مرگ یاخته‌ای را القا می‌کند. در مرگ یاخته‌ای، یاخته به وسیله آنزیم‌های خود گوارش می‌شود و در نتیجه، ارتباط آن با یاخته‌های سالم قطع می‌شود.

طرح‌های پیشنهادی برای همانندسازی

همانندسازی غیر حفاظتی	همانندسازی نیمه حفاظتی	همانندسازی حفاظتی
شکست پیوند فسفودی استر در رشته قدیمی	عدم شکست پیوند فسفودی استر در رشته قدیمی	عدم شکست پیوند فسفودی استر در رشته قدیمی
تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید جدید و قدیم	تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید جدید و قدیم	عدم تشکیل پیوند هیدروژنی نوکلئوتید جدید و قدیم
شکست پیوند فسفودی استر طی ویرایش	شکست پیوند فسفودی استر طی ویرایش	شکست پیوند فسفودی استر طی ویرایش
شکست پیوند هیدروژنی حین همانندسازی	شکست پیوند هیدروژنی حین همانندسازی	شکست پیوند هیدروژنی حین همانندسازی
تولید رشته با چگالی متوسط	تولید مولکول دنا با چگالی متوسط	عدم تولید رشته یا مولکول با چگالی متوسط

هر سلول حاصل هم بخشی از دنا جدید و هم بخشی از دنا قدیمی را دریافت می‌کند.	هر سلول حاصل هم بخشی از دنا جدید و هم بخشی از دنا قدیمی را دریافت می‌کند.	هر سلول حاصل تنها دنا جدید و یا دنا قدیمی را دریافت می‌کند.
تبعبیت از چارگاف	تبعبیت از چارگاف	تبعبیت از چارگاف

کدام طرح مورد تأیید قرار گرفته است؟

- مزلسون و استال با به‌کارگیری روش علمی، پاسخ این پرسش را به دست آوردند:
- ۱- آن‌ها ابتدا دنا را با نوکلئوتیدهای که ایزوتوپ سنگین نیتروژن دارند، نشانه‌گذاری کردند تا بتوانند رشته‌های دنا قدیمی را از نوساز تشخیص دهند. برای این کار، آن‌ها ابتدا باکتری‌ها را در محیط دارای ^{15}N کشت دادند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر، باکتری‌هایی تولید شدند که دنا سنگین‌تری نسبت به باکتری‌های اولیه داشتند.
 - ✓ دناهایی که با ^{15}N ساخته می‌شوند، نسبت به دنا معمولی که در نوکلئوتیدهای خود ^{14}N دارد چگالی بیشتری دارند؛ بنابراین، به‌وسیلهٔ گریزانهٔ با سرعت بالا می‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد.
 - ✓ مزلسون و استال از باکتری E.Coli (اشرشیا کلای) استفاده کردند.
 - ۲- سپس این باکتری‌ها را به محیط کشت دارای ^{14}N منتقل کردند.
 - ۳- با توجه به اینکه تقسیم باکتری‌ها حدود ۲۰ دقیقه طول می‌کشد، در فواصل ۲۰ دقیقه، باکتری‌ها را از محیط کشت جدا و بررسی کردند.
 - ✓ برای سنجش چگالی دناها در هر فاصلهٔ زمانی، دنا باکتری را **استخراج** و در شیبی از محلول سزیم کلرید با غلظت‌های متفاوت و در سرعتی بسیار بالا گریز دادند؛ در نتیجه مواد بر اساس چگالی، در بخش‌های مختلفی از محلول قرار گرفتند.
 - نمونهٔ اول (صفر دقیقه): پس از گریز دادن، **یک** نوار سنگین در **انتهای** لوله‌شکل می‌گیرد.
 - نمونهٔ دوم (بیست دقیقه): پس از گریز دادن، **یک** نوار در **میانۀ** لوله تشکیل می‌شود. اینجا فرضیهٔ همانندسازی حفاظتی رد میشه!
 - نمونهٔ سوم (چهل دقیقه): پس از گریز دادن، دو نوار در لوله تشکیل می‌شود. یک نوار در میانۀ لوله و دیگری در بالای لوله قرار دارد. اینجا فرضیهٔ همانندسازی غیر حفاظتی رد میشه.
 - از نمونهٔ سوم به بعد: نوار در قسمت جدیدی از لوله تشکیل **نمی‌شود**؛ بلکه تنها ضخامت نوار بالای لوله افزایش می‌یابد.

اگر طرح همانندسازی، حفاظتی بود	اگر طرح همانندسازی، غیر حفاظتی بود
✓ پس از یک دور همانندسازی، دنا اولیه به‌صورت دست‌نخورده باقی‌مانده و وارد یکی از سلول‌های دختری شده و یک مولکول دنا تازه‌ساخت (^{14}N) وارد سلول دیگر می‌شود.	✓ پس از یک دور همانندسازی، هر رشته دنا حاصل، به‌صورت پراکنده دارای قطعاتی از دنا جدید و قدیمی خواهد بود؛ یعنی در یک‌رشته هر دو نوع نیتروژن سبک و سنگین یافت می‌شود.
✓ در این صورت پس از یک دور همانندسازی، یک نوار در پایین لوله و یک نوار در بالای لوله تشکیل خواهد شد. پس از هربار همانندسازی نیز نوار بالایی ضخیم‌تر خواهد شد.	✓ در این صورت پس از یک دور همانندسازی، یک نوار در وسط لوله تشکیل خواهد شد.
	✓ با توجه به ثابت بودن نیتروژن‌های سنگین و همچنین کشت باکتری در محیط با نیتروژن سبک، پس از هر بار همانندسازی، نسبت نیتروژن‌های سبک به سنگین در هر رشته افزایش خواهد یافت.

محل پروتئین‌سازی و سرنوشت آن‌ها

در هر بخشی از یاخته که رناتن‌ها حضور دارند می‌تواند انجام شود.	ساخت پروتئین‌ها
ریبوزوم‌های آزاد سیتوپلاسم	
ساخت پروتئین‌هایی که در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم، هسته، میتوکندری و یا کلروپلاست فعالیت می‌کنند.	
ریبوزوم‌های متصل به شبکهٔ آندوپلاسمی	ساخت پروتئین‌ها
ریبوزوم‌های غشایی، ترشحی، واکوئل و لیزوزوم	
همهٔ این پروتئین‌ها از شبکهٔ آندوپلاسمی و جسم‌گلژی عبور می‌کنند.	
ریبوزوم از طریق زیر واحد بزرگ خود به غشای شبکهٔ آندوپلاسمی متصل می‌شود.	

ریبوزوم‌های میتوکندری و کلروپلاست	ساخت بعضی پروتئین‌های مورد نیاز خود
ساخت پروتئین‌ها	✓ برخی پروتئین‌های میتوکندری و کلروپلاست، توسط ریبوزوم‌های آزاد سیتوپلاسم ساخته می‌شود. ✓ هر پروتئینی که در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم فعالیت می‌کند؛ لزوماً توسط ریبوزوم‌های آزاد ساخته نمی‌شود! مثلاً آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده توسط ریبوزوم‌های متصل به شبکهٔ آندوپلاسمی در یاختهٔ کشندهٔ طبیعی ساخته می‌شود اما در سیتوپلاسم یاختهٔ هدف فعالیت می‌کند.
مقصد پروتئین	بر اساس مقصدی که پروتئین باید برود، توالی‌های آمینواسیدی در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می‌کند. ✓ ساختار اول پروتئین در هدایت پروتئین به مقصد نقش دارد. ✓ در پروتئین‌هایی که در یک بخش خاص فعالیت می‌کنند، یک توالی یکسان می‌تواند مشاهده شود. مثلاً همهٔ پروتئین‌هایی که به واکوئل می‌روند، یک توالی خاص جهت هدایت آن‌ها به واکوئل وجود دارد.
نکته!	ریبوزوم از زیر واحد بزرگ خود به شبکه آندوپلاسمی متصل می‌شود، اما همان‌طور که می‌دانید اولین ترجمه قبل از تکمیل ساختار ریبوزوم انجام می‌شود؛ پس قبل از اتصال ریبوزوم به شبکه آندوپلاسمی، اولین ترجمه انجام می‌شود. پس می‌توان گفت شروع ساخت هر پروتئینی در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم می‌باشد. اگر پروتئین قرار باشد به خارج ترشح شود یا به بخش‌هایی مثل واکوئل و لیزوزوم برود، پس از تکمیل ساختار ریبوزوم، به شبکه آندوپلاسمی متصل می‌شود.

ژنتیک انسانی!											
گروه خونی Rh	✓ این گروه‌خونی بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه‌های قرمز جای دارد و پروتئین D نامیده می‌شود. اگر این پروتئین وجود داشته باشد، گروه خونی Rh مثبت است و اگر نباشد، منفی است.										
	✓ بودن یا نبودن این پروتئین به نوعی ژن بستگی دارد. دو ژن در ارتباط با این پروتئین در مردم دیده می‌شود. یکی D که می‌تواند پروتئین D را بسازد و یکی d که نمی‌تواند این پروتئین را بسازد. D و d جایگاه یکسانی در فام‌تن شمارهٔ یک یعنی بزرگ‌ترین فام‌تن بدن دارند. به این جایگاه از فام‌تن، جایگاه ژن‌های Rh می‌گویند.										
	<table><tr><th>ژن نمود</th><th>رخ نمود</th></tr><tr><td>DD</td><td>مثبت</td></tr><tr><td>Dd</td><td>مثبت</td></tr><tr><td>dd</td><td>منفی</td></tr></table>	ژن نمود	رخ نمود	DD	مثبت	Dd	مثبت	dd	منفی		
	ژن نمود	رخ نمود									
	DD	مثبت									
Dd	مثبت										
dd	منفی										
✓ در این گروه خونی، خون به چهار گروه A، B، AB و O تقسیم می‌شود. این گروه‌بندی بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات به نام‌های A و B در غشای گلبول‌های قرمز است. اضافه شدن این کربوهیدرات به غشای گلبول‌های قرمز یک واکنش آنزیمی می‌باشد.											
✓ دو نوع آنزیم وجود دارد. یکی آنزیمی که کربوهیدرات A را به غشا اضافه می‌کند و دیگری آنزیمی که سبب اضافه شدن کربوهیدرات B به غشا می‌شود. اگر هیچ‌یک از این دو آنزیم وجود نداشته باشند، آنگاه هیچ کربوهیدراتی به غشا اضافه نخواهد شد؛ بنابراین برای این صفت، سه دگره وجود دارد. دگره‌ای که آنزیم A را می‌سازد، دگره‌ای که آنزیم B را می‌سازد و دگره‌ای که هیچ آنزیمی نمی‌سازد. جایگاه ژن‌های گروه خونی ABO در فام‌تن شمارهٔ ۹ می‌باشد.											
گروه خونی ABO	✓ آلل‌های A و B نسبت به هم هم‌توان اما نسبت به آلل O، بارز می‌باشند.										
	<table><tr><th>ژن نمود</th><th>رخ نمود</th></tr><tr><td>AA یا AO</td><td>A</td></tr><tr><td>BB یا BO</td><td>B</td></tr><tr><td>AB</td><td>AB</td></tr><tr><td>OO</td><td>O</td></tr></table>	ژن نمود	رخ نمود	AA یا AO	A	BB یا BO	B	AB	AB	OO	O
	ژن نمود	رخ نمود									
	AA یا AO	A									
	BB یا BO	B									
AB	AB										
OO	O										

هموفیلی	علائم	✓ در این بیماری فرآیند لخته شدن خون دچار مشکل می شود. ✓ پس هر اختلال در لخته شدن خون به دلیل کمبود یون کلسیم یا ویتامین K نمی باشد. ✓ در این بیماران و در صورت خون ریزی، می توان انتظار داشت تا هورمون اریتروپوئیتین به طور غیرطبیعی افزایش یابد.
	انواع	✓ هموفیلی انواعی دارد و شایع ترین نوع آن مربوط به فقدان عامل انعقادی VIII (هشت) می باشد.
	ژن نمود	دو دگره H (سالم) و h (هموفیل) برای این بیماری وجود دارد. مرد تنها می تواند دو ژن نمود X^{hY} و X^{HY} داشته باشد؛ یعنی نمی تواند ناقل باشد. زن دارای سه ژن نمود، X^{HX^h}، X^{HX^H} و X^{hX^h} باشد که دو ژن نمود اول سالم و ژن نمود آخر بیمار می باشد. بیمار بودن پسر کاملاً بستگی به مادر دارد اما بیمار بودن دختر علاوه بر مادر، به پدر نیز بستگی دارد.
	نکته!	✓ هر زن مبتلا به هموفیلی، قطعاً پسرانی مبتلا به هموفیلی خواهد داشت. ✓ هر زن مبتلا به هموفیلی، در صورت ازدواج با مردی سالم، دخترانی سالم و ناقل خواهد داشت. ✓ هر زن مبتلا به هموفیلی، در صورت ازدواج با مردی بیمار، قطعاً فرزندی بیمار خواهد داشت. ✓ هر مرد مبتلا به هموفیلی، در صورت ازدواج با زنی سالم و خالص، هیچ فرزند بیماری نخواهد داشت. ✓ هر مرد مبتلا به هموفیلی، در صورت ازدواج با زنی سالم و ناقل، می تواند دخترانی سالم و ناقل و یا دخترانی بیمار داشته باشد. ✓ هر فرد مبتلا به هموفیلی، مادری با ژن نمود X^{HX^h} و یا X^{hX^h} دارد. ✓ هر دختر مبتلا به هموفیلی، قطعاً پدری بیمار با ژن نمود X^{hY} خواهد داشت.
PKU	علت	در این بیماری، آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را تجزیه می کند وجود ندارد. تجمع فنیل آلانین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود و مغز آسیب می بیند.
	مهاری	گرچه اغلب بیماری های ژنتیک را نمی توان درمان کرد اما گاهی می توان با تغییر عوامل محیطی، عوارض بیماری های ژنی را مهار کرد. علت این بیماری تغذیه از پروتئین های حاوی فنیل آلانین (در شیر مادر یافت می شوند) است. پس با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آلانین دارند، می توان مانع بروز اثرات بیماری شد. در صورت ابتلا، نوزاد با شیر خشک های فاقد فنیل آلانین تغذیه شده و در رژیم غذایی او برای آینده، از رژیم های بدون (یا کم) فنیل آلانین استفاده می شود. ✓ مبتلا برخلاف نوزاد مبتلا می تواند از غذاهای دارای فنیل آلانین (کم) تغذیه کند.
	ژنوتیپ	✓ این بیماری یک بیماری غیر وابسته به جنس و نهفته می باشد و هنگامی که نوزاد متولد می شود علائم آشکاری ندارد! آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین توسط A کد می گردد. ژنوتیپ فرد سالم به شکل های AA و Aa و فرد بیمار به شکل aa خواهد بود. ✓ اگر هر دو والد به این بیماری مبتلا باشند، به طور قطع تمام فرزندان نیز مبتلا خواهند بود. ✓ اگر یکی از والدین سالم و خالص باشد، به طور قطع هیچ کدام از فرزندان به این بیماری مبتلا نخواهند بود.
	آزمایش	نوزادان را در بدو تولد از نظر ابتلای احتمالی به این بیماری، با انجام آزمایش خون بررسی می کند. برای بررسی، از پاشنه پای نوزاد، خون گرفته می شود.
مالاریا	عامل	✓ نوعی انگل تک یاخته ای که بخشی از چرخه زندگی خود را در گویچه های قرمز می گذراند. ✓ مالاریا بخشی از زندگی خود را در بیرون از RBC انجام می دهد.
	اهمیت ناخالص ها	✓ فراوانی دگره HB^S در مناطقی که مالاریا شایع است، بسیار بیشتر از سایر مناطق است. این انگل نمی تواند در افراد با ژنوتیپ ناخالص سبب بیماری شود، پس افراد $HB^A HB^S$ در برابر این بیماری مقاوم اند. مالاریا با ورود به گلبول های قرمز این افراد و مصرف اکسیژن، سبب داسی شکل شدن این گلبول ها و در نهایت مرگ خودش می گردد. ✓ در افراد با ژنوتیپ ناخالص از نظر این بیماری، گویچه های قرمز تنها زمانی داسی می شوند که اکسیژن محیط کم باشد.

ژنتیک گیاهی!		
گل میمونی	رابطه بین آلل‌ها	نوعی رابطه بین دگرها برقرار است که صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت‌های خالص مشاهده می‌شود. به این رابطه، بارزیت ناقص گفته می‌شود. در رابطه بارزیت ناقص، تعداد فنوتیپ‌ها و ژنوتیپ‌ها، برابر است.
	انواع دگرها	دو دگره برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز (R) و دیگری سفید (W) است.
	ژنوتیپ و فنوتیپ	WW در این حالت، رنگ گلبرگ‌ها سفید می‌باشد.
		RR در این حالت، رنگ گلبرگ‌ها قرمز می‌باشد.
		RW در این حالت، رنگ گلبرگ‌ها صورتی می‌باشد. رنگ صورتی حد واسط قرمز و سفید است.
نوعی ذرت	آندوسپرم	یکی از سؤالاتی که طراحا خیلی دوشش دارن ترکیب ژنتیک و آندوسپرمه! می‌دانیم که آندوسپرم از لقاح بین یاخته دو هسته‌ای و یکی از اسپرم‌ها ایجاد می‌شود. پس در آندوسپرم یک گیاه، حداقل ۲ دگره یکسان می‌باشند. مثلاً اگر والد ماده RW باشد: ۱ یاخته دو هسته‌ای می‌تواند RR باشد: الف) اگر این یاخته با اسپرم R لقاح پیدا کند: ژنوتیپ آندوسپرم RRR خواهد بود. ب) اگر این یاخته با اسپرم W لقاح پیدا کند: ژنوتیپ آندوسپرم RRW خواهد بود. ۲ یاخته دو هسته‌ای می‌تواند WW باشد: الف) اگر این یاخته با اسپرم R لقاح پیدا کند: ژنوتیپ آندوسپرم WWR خواهد بود. ب) اگر این یاخته با اسپرم W لقاح پیدا کند: ژنوتیپ آندوسپرم WWW خواهد بود. ✓ اگر ژنوتیپ والد ماده‌ای WW باشد، آندوسپرم آن نمی‌تواند واجد دو دگره R باشد. ✓ اگر ژنوتیپ والد ماده‌ای RR باشد، آندوسپرم آن حداکثر واجد یک W خواهد بود که آن هم دگره دریافتی از اسپرم می‌باشد.
	رنگ نوعی ذرت، مثالی از صفات چندجایگاهی است.	✓ رنگ این ذرت طیفی از سفید تا قرمز می‌باشد. صفت رنگ در این نوع ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره دارند. برای نشان دادن دگرها از حروف بزرگ و کوچک ABC استفاده می‌کنیم. دگره‌های بارز، رنگ قرمز و دگره‌های نهفته، رنگ سفید دارند؛ بنابراین رخنمودهای دو آستانه طیف، یعنی قرمز و سفید، به ترتیب ژن نمود AABBCc و aabbcc دارند. هر چه قدر تعداد دگره‌های بارز بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز بیشتر است. ✓ دگره بارز سبب تولید رنگ دانه قرمز می‌شود.

ژنتیک جانوری		
زنبور	در جمعیت زنبورها، سه نوع زنبور دیده می‌شوند:	
	۱ زنبور ملکه (ماده و ۲n): زایا بوده و می‌تواند کاستمان انجام دهد.	
	۲ زنبور نر (n): زایا بوده اما تولید یاخته جنسی آن به وسیله رشتمان صورت می‌گیرد.	
	زنبور نر نمی‌تواند تتراد تشکیل دهد.	
	۳ زنبور کارگر (ماده و ۲n): زایا نمی‌باشد و نمی‌تواند تخمک ایجاد کند.	
زنبور	✓ زنبور ملکه می‌تواند بکرزایی انجام دهد. بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی بوده که گاهی اوقات، فرد ماده به تنهایی تولیدمثل می‌کند.	
	✓ در بکرزایی زنبور، تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می‌کند؛ یعنی جانوری با یک مجموعه کروموزومی تشکیل می‌شود.	
	✓ در بکرزایی زنبور، همواره جانوری با عدد کروموزومی n تشکیل می‌شود؛ یعنی همواره زنبور نر ایجاد خواهد شد.	
	✓ هر زنبور ۲n کروموزومی، قطعاً در پی لقاح تخمک ملکه و اسپرم زنبور نر تشکیل می‌شود.	
	✓ اگر صفتی در زنبور، دو آللی باشد (Aa) و ملکه از نظر این صفت Aa باشد:	
زنبور	۱ زنبور نر حاصل، a یا A خواهد بود.	
	۲ زنبورهای ماده می‌توانند AA، aa و یا Aa باشند؛ زیرا یاخته جنسی زنبور نر a یا A و تخمک ملکه نیز A یا a خواهد بود.	

کرم خاکی

- ✓ نوعی جانور هرمافرودیت می باشد؛ یعنی هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.
- ✓ نمی تواند خود را بارور کند.
- ✓ لقاح دو طرفی دارد؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، زامه های هر کدام، تخمک های دیگری را بارور می سازد.
- ✓ اگر صفتی در کرم خاکی دو آللی باشد (Bb) و یک کرم خاکی از نظر این صفت Bb باشد:
- 1 اسپرم ها و تخمک های آن می تواند b یا B باشند.
- 2 در صورت لقاح با کرم خاکی با ژنوتیپ BB، هیچ گاه تخمی با ژنوتیپ bb تشکیل نخواهد شد.
- ✓ اگر صفتی در کرم خاکی دو آللی باشد (Cc) و یک کرم خاکی از نظر این صفت، CC باشد، اسپرم ها و تخمک های آن CC خواهند بود و در صورت لقاح با یک کرم خاکی با ژنوتیپ CC، در بدن هر کرم خاکی، یک تخم CC تشکیل می شود.

گونه زایی دگر میهنی	گونه زایی هم میهنی	
رخ می دهد	رخ می دهد	جدایی تولیدمثلی
رخ می دهد	مثلاً بر اثر وقوع رخدادهای زمین شناختی و سدهای جغرافیایی، یک جمعیت به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود.	جدایی جغرافیایی
تدریجی	یک باره	مدت زمان
✓ عدم شارش ✓ جهش ✓ نوترکیبی ✓ رانش ✓ انتخاب طبیعی	✓ شارش ✓ بروز خطاهای میوزی ✓ نوترکیبی ✓ رانش ✓ و عوامل دیگر	عوامل مؤثر

جمع بندی زنجیره انتقال الکترون

این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در غشای درونی راکیزه قرار دارند و می توانند الکترون بپذیرند یا از دست دهند. در این زنجیره، الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی می رسند.	پروتئین اول	✓ نوعی پروتئین سراسری می باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را دارد. ✓ مستقیماً سبب بازسازی NAD^+ می شود. ✓ در انتقال الکترون های FADH_2 هیچ نقشی ندارد.
	پروتئین دوم	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی باشد. ✓ خاصیت آب گریزی آن زیاد بوده و فقط با دم های آب گریز فسفولیپیدهای غشایی در تماس است. ✓ مستقیماً سبب بازسازی FAD می شود. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را ندارد.
	پروتئین سوم	✓ نوعی پروتئین سراسری می باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را دارد.
	پروتئین چهارم	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را ندارد. ✓ خاصیت آب دوستی آن از پروتئین دوم بیشتر است. ✓ با سرهای فسفولیپیدهای غشایی نیز در تماس است. ✓ الکترون دریافتی توسط این مولکول، در خارجی ترین بخش غشای درونی راکیزه می گیرد.
	پروتئین پنجم	✓ نوعی پروتئین سراسری می باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را دارد. ✓ الکترون را از مولکول قبلی می گیرد و به اکسیژن مولکولی مستقر در فضای داخلی راکیزه می دهد. ✓ سبب تبدیل اکسیژن به یون اکسید و تولید آب می شود.

کلروپلاست	دو نوع زنجیره انتقال الکترون در غشای تیلاکوئیدها وجود دارد. یک زنجیره بین فتوسیستم ۱ و مولکول $NADP^+$ قرار دارد.	زنجیره اول	پروتئین اول	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی‌باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای درون تیلاکوئید را ندارد. ✓ خاصیت آب‌گریزی آن زیاد بوده و فقط با دم‌های آب‌گریز فسفولیپیدهای غشایی در تماس است. ✓ الکترون را از فتوسیستم ۲ می‌گیرد و به پمپ پروتونی می‌دهد.
			پروتئین دوم	✓ نوعی پروتئین سراسری می‌باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای بین دو غشا را دارد. ✓ الکترون را از مولکول قبلی می‌گیرد و به مولکولی در سطح داخلی غشای تیلاکوئید می‌دهد.
			پروتئین سوم	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی‌باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای درون تیلاکوئید را ندارد. ✓ در سطح داخلی تیلاکوئید قرار دارد. ✓ نوعی پروتئین آب‌دوست بوده و فقط با سرهای فسفولیپیدهای غشایی تماس دارد. ✓ ضمن دریافت الکترون از مولکول قبلی، الکترون به سطح داخلی غشای تیلاکوئید منتقل شده و به فتوسیستم ۱ می‌رود.
			پروتئین اول	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی‌باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای درون تیلاکوئید را ندارد. ✓ نسبت به پروتئین بعدی کوچک‌تر بوده و تنها با فسفولیپیدهای لایه خارجی غشا در تماس است.
زنجیره دوم			پروتئین دوم	✓ نوعی پروتئین سراسری نمی‌باشد. ✓ توانایی پمپ پروتون به فضای درون تیلاکوئید را ندارد. ✓ نسبت به پروتئین قبلی بزرگ‌تر بوده و تنها با فسفولیپیدهای لایه خارجی غشا در تماس است. ✓ مستقیماً سبب تولید $NADPH$ می‌شود.

C_3	CAM	C_4
مثل گل رز	مثل آناناس	مثل ذرت
تثبیت کربن در میانبرگ	تثبیت کربن در میانبرگ	تثبیت کربن در میانبرگ و غلاف آوندی
عدم تقسیم مکانی برای تثبیت کربن	عدم تقسیم مکانی برای تثبیت کربن	تقسیم مکانی برای تثبیت کربن
عدم تقسیم زمانی برای تثبیت کربن	تقسیم زمانی برای تثبیت کربن	عدم تقسیم زمانی برای تثبیت کربن
اولین ترکیب پایدار، سه کربنه می‌باشد.	اولین ترکیب پایدار، چهار کربنه می‌باشد.	اولین ترکیب پایدار، چهار کربنه می‌باشد.
CO_2 با ریبولوزبیس فسفات ترکیب می‌شود.	در شب: ترکیب CO_2 با اسید سه کربنه	اول: ترکیب CO_2 با اسید سه کربنه
	در روز: جدا شدن CO_2 از اسید چهار کربنه و سپس ترکیب با ریبولوزبیس فسفات	دوم: جدا شدن CO_2 از اسید چهار کربنه و سپس ترکیب با ریبولوزبیس فسفات
تثبیت کربن در میانبرگ و نگهبان روزنه	تثبیت کربن در میانبرگ و نگهبان روزنه	تثبیت کربن در میانبرگ، غلاف آوندی و نگهبان روزنه
چرخه کالوین در میانبرگ و نگهبان روزنه	چرخه کالوین در میانبرگ و نگهبان روزنه	چرخه کالوین در غلاف آوندی و نگهبان روزنه
عبور اسید از پلاسمودسم‌ها در هر سه نوع گیاه دیده می‌شود! منافذ پلاسمودسم آن‌قدر بزرگ است که نوکلئیک‌اسیدها و حتی ویروس‌های گیاهی می‌توانند از آن عبور کنند؛ پس نوکلئیک‌اسیدها از پلاسمودسم‌ها عبور می‌کنند.		
عدم عبور اسید چهار کربنه از پلاسمودسم‌ها	عدم عبور اسید چهار کربنه از پلاسمودسم‌ها	عبور اسید چهار کربنه از پلاسمودسم‌ها

جمع بندی جانوری

تک سلولی ها




- ✓ در تک یاخته‌ای‌ها تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن انجام می‌شود.
 - ✓ برخی (نه همه!) از جانداران، مواد مغذی را از سطح یاخته (تک سلولی) یا بدن (پرسلولی) و به‌طور مستقیم از محیط دریافت می‌کنند. این محیط، آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان است. آیا هر جانوری که از بدن جانور دیگر، مواد مغذی رو دریافت کنه، لزوماً انگله؟ فیله؛ نلته زیر رو بفون!
 - ✓ در سیرابی گاو، جذب گلوکز دیده می‌شود. میکروب‌هایی که در سیرابی زندگی می‌کنند، گلوکز مورد نیاز خود را مستقیماً از توده غذایی وارد شده به سیرابی جذب می‌کنند. دقت کنید جذب گلوکز در سیرابی توسط میکروب‌ها صورت می‌گیره و فود یافته‌های سیرابی این کار رو انجام نمی‌دهند!
 - ✓ در تک سلولی‌ها، گازها می‌توانند بین سلول و محیط به‌طور مستقیم مبادله شوند.
 - ✓ در بسیاری (نه همه) از تک سلولی‌ها، تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می‌شود.
 - ✓ تک یاخته‌ای‌ها، فاقد محیط داخلی می‌باشند.
 - ✓ تک یاخته‌ای‌ها، دارای هر هفت ویژگی جانداران می‌باشند.
- تو بعضی تست‌ها میان از عبارت‌های کلی نظیر «همواره + سلول‌ها» استفاده می‌کنی! اینجا موقعاً حواستون به تک سلولی‌ها باشه!

پارامسی (تک یاخته‌ای، بیضی شکل و ساکن آب شیرین)




گوارش



- ✓ گوارش درون سلولی دارد.
- ✓ همه بخش‌های آن، به غیر از انتهای حفره دهانی و منفذ دفعی، مژک دارد.
- ✓ مژک‌های حفره دهانی نسبت به سایر مژک‌ها طول بیشتری دارند.
- ✓ در پارامسی، حرکت مژک‌ها، غذا را از محیط به فرورفتگی به نام حفره دهانی منتقل می‌کند.
- ✓ در انتهای این حفره، کریچه غذایی تشکیل می‌شود. کریچه غذایی درون سیتوپلاسم حرکت می‌کند و محتویات آن ریزتر (گوارش مکانیکی) می‌شوند.
- ✓ لیزوزوم‌ها (دارای آنزیم) به کریچه غذایی می‌پیوندند، آنزیم‌های خود را به درون آن آزاد می‌کنند و کریچه گوارشی شکل می‌گیرد.
- ✓ مواد گوارش یافته از این کریچه خارج می‌شوند و مواد گوارش نیافته در آن باقی می‌مانند. به این کریچه، کریچه دفعی گفته می‌شود.
- ✓ محتویات این کریچه (نه خود کریچه!) از راه منفذ دفعی سلول و از طریق اگزوسیتوز (مصرف انرژی) خارج می‌شوند.

تنظیم اسمزی



- ✓ در پارامسی، آبی که در نتیجه اسمز وارد می‌شود، به همراه مواد دفعی توسط کریچه‌های انقباضی دفع می‌شود.
- ✓ فشار اسمزی پارامسی از فشار اسمزی محیط بیشتر است و آب به آن وارد می‌شود.
- ✓ کریچه دفعی همانند کریچه انقباضی در دفع مواد نقش دارد.
- ✓ کریچه انقباضی برخلاف کریچه دفعی، در تنظیم اسمزی پارامسی نقش دارد.

پریاخته‌ای‌ها




- ✓ برخی از پرسلولی‌ها همانند تک سلولی‌ها، مواد مغذی را از سطح بدن و به‌طور مستقیم از محیط دریافت می‌کنند.
- ✓ در برخی از پریاخته‌ای‌ها نظیر کرم پهن یا هیدر آب شیرین، گازها می‌توانند بین سلول‌ها و محیط مبادله شوند. در سایر جانوران، ساختارهای تنفسی ویژه‌ای مشاهده می‌شود که ارتباط سلول‌های بدن را با محیط فراهم می‌کند.
- ✓ در جانداران پرسلولی، به دلیل زیاد بودن تعداد یاخته‌ها، همه یاخته‌ها با محیط بیرون در ارتباط نیستند و لازم است در آن‌ها دستگاه گردش موادی

- به وجود آید تا سلول‌ها نیازهای غذایی و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند.
- ✓ بیشتر (نه همه!) بی‌مهرگان (پریاخته‌ای) دارای ساختارهای مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختارها، نفیریدی است که برای دفع، تنظیم اسمزی یا هردو به کار می‌رود. نفیریدی لوله‌ای است که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می‌شود.
 - ✓ در برخی بی‌مهرگان آبری نظیر ستاره دریایی، آبشش‌ها پراکنده هستند. در سایر بی‌مهرگان، آبشش‌ها به نواحی خاص محدود می‌شوند.




گوارش و گردش مواد



یاخته‌های پوشاننده حفره گوارشی

- ✓ گوارش در جانوری مانند هیدر در کیسه‌ای به نام حفره گوارشی انجام می‌شود.
- ✓ این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد.
- ✓ یاخته‌هایی (نه همه یاخته‌ها) در این حفره، آنزیم‌هایی ترشح می‌کنند که فرآیند گوارش را به صورت برون‌یاخته‌ای آغاز می‌کنند.
- ✓ یاخته‌های این حفره، ذره‌های غذایی را با درون‌بری دریافت می‌کنند. سپس فرآیند گوارش به صورت درون‌سلولی در حفره گوارشی ادامه پیدا می‌کند.
- ✓ برخی یاخته‌های حفره گوارشی، در یک سطح خود، تعدادی زائده دارند.
- ✓ آنزیم‌های برون‌یاخته‌ای در هیدر، مونومر ایجاد نمی‌کند.
- ✓ کیسه حفره گوارشی، پر از مایعات بوده و گردش مواد نیز درون همین کیسه و انشعابات آن انجام می‌شود.
- ✓ در این جانوران، حرکات بدن به جابه‌جایی مواد کمک می‌کند.
- ✓ حفره گوارشی هیدر از دو لایه سلول استوانه‌ای شکل (درونی) و مکعبی (بیرونی) تشکیل شده است.
- ✓ در هیدر، دو نوع زائده وجود دارد:
- الف) زوائد یاخته‌های آن
- ب) زوائد خود هیدر یعنی بازوهای آن

ساختار عصبی




- ✓ هیدر مغز ندارد.
- ✓ ساده‌ترین ساختار عصبی، شبکه عصبی در هیدر است.
- ✓ شبکه عصبی آن، مجموعه‌ای از نورون‌های پراکنده در دیواره بدن هیدر است که باهم ارتباط دارند.
- ✓ تحریک هر نقطه از بدن جانور، در همه سطح آن منتشر می‌گردد.
- ✓ شبکه عصبی در بازوهای هیدر نیز وجود دارد.
- ✓ شبکه عصبی هیدر، در بین دولایه آن (بین لایه استوانه‌ای و مکعبی) قرار گرفته است.
- ✓ شبکه عصبی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را تحریک می‌کند؛ پس در هیدر، یاخته‌های ماهیچه‌ای نیز وجود دارد.



عروس دریایی و تولیدمثل

- ✓ عروس دریایی، اسکلت آبایستایی دارد.
- ✓ اسکلت آبایستایی، در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می‌دهد.
- ✓ ضمناً در این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می‌کند.
- ✓ عروس دریایی، ایمنی غیراختصاصی دارد.
- ✓ در آبیان مثل ماهی‌ها و دوزیستان و بی‌مهرگان آبری، لقاح خارجی دیده می‌شود.

اسفنج‌ها



- ✓ سامانه گردش آب دارند.
- ✓ در این سامانه، آب از محیط بیرون از طریق سوراخ‌های دیواره به حفره یا حفره‌هایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخ‌های بزرگ‌تری خارج می‌شود.
- ✓ عامل حرکت آب، یاخته‌های یقه‌دار هستند که تازک دارند.
- ✓ قطعاً، آب از طریق چندین سوراخ کوچک به اسفنج وارد و از طریق یک یا چند سوراخ بزرگ‌تر از آن خارج می‌شود.
- ✓ منفذ ورود آب در اسفنج توسط نوعی خاصی از سلول به نام یاخته سازنده منفذ ایجاد می‌شود.
- ✓ در اطراف محل خروج آب، زائده‌های سوزنی‌شکل بلندی دیده می‌شود.
- ✓ همچنین سطح بیرونی اسفنج نیز دارای تعدادی زائده سوزنی‌شکل کوتاه‌تر می‌باشد.
- ✓ در دیواره اسفنج، قطعاً بیش از دو نوع یاخته مشاهده می‌شود.

کرم‌های پهن



- ✓ برخی نظیر کرم کدو، فاقد دهان و دستگاه گوارش می‌باشند. این جانور مواد مغذی را از سطح بدن خود و به‌طور مستقیم از محیط دریافت می‌کند.
- ✓ کرم‌های پهن نظیر کرم کبد، هرمافرودیت هستند و هر فرد تخمک‌های خود را بارور می‌کند.
- ✓ طبق شکل، در کرم‌های پهن نظیر کرم کبد، بیضه‌ها متعدد می‌باشند اما فقط یک تخمدان و یک رحم وجود دارد.




بایرن حالا پلانتاریا رو بررسی کنیم!

حفره گوارشی

- ✓ کرم‌های پهن آزادی همانند پلانتاریا، حفره گوارشی دارند.
- ✓ در کرم‌های پهن آزادی نظیر پلانتاریا، انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می‌کنند به‌طوری که فاصله انتشار مواد تا یاخته‌ها بسیار کوتاه است.
- ✓ حرکات بدن به جابه‌جایی مواد کمک می‌کند.

شبکه عصبی و ایمنی

- ✓ در پلانتاریا، دو گره عصبی به هم جوش نخورده در سر جانور، مغز را تشکیل داده‌اند.
- ✓ هر گره، مجموعه‌ای از جسم یاخته‌های عصبی است.
- ✓ دو طناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شده‌اند، با رشته‌های به هم متصل‌اند و ساختار نردبان‌مانندی را ایجاد می‌کنند. این مجموعه، بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است.
- ✓ رشته‌های جانبی متصل به آن نیز، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می‌دهد.
- ✓ فاصله بین طناب‌های عصبی در بخش‌های انتهایی بدن کمتر می‌باشد.
- ✓ لفظ «طناب‌های عصبی» تنها برای پلانتاریا صحیح است و برای حشرات و مهره‌داران غلطه!
- ✓ ایمنی غیراختصاصی دارد.




کرم‌های حلقوی نظیر کرم خاکی



تنفس

- ✓ کرم خاکی، تنفس پوستی دارد.
- ✓ سطح پوست در جانورانی که تنفس پوستی دارند (مثل کرم‌خاکی) مرطوب نگه داشته می‌شود.
- ✓ در تنفس پوستی، شبکه مویرگی زیرپوستی با مویرگ‌های فراوان وجود دارد.





گردش مواد

- ✓ ساده‌ترین سامانه گردش بسته در کرم‌های حلقوی نظیر کرم‌خاکی وجود دارد.
- ✓ قلب کرم خاکی، دو دریچه دارد:
- ✎ (الف) یک دریچه بین قلب و سرخرگ که به سمت داخل سرخرگ باز می‌شود.
- ✎ (ب) یک دریچه بین سیاهرگ و قلب که به سمت داخل قلب باز می‌شود.


ایمنی و تولیدمثل

- ✓ ایمنی غیراختصاصی دارد.
- ✓ کرم‌های حلقوی نظیر کرم خاکی نیز هرمافرودیت هستند.
- ✓ کرم‌های حلقوی مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی دارند؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می‌گیرند، زامه‌های هر کدام، تخمک‌های دیگری را بارور می‌سازد.

حشرات



- ✓ گروهی از بندپایان
- ✓ گوناگونی آن‌ها در زیستگاهی با گیاهان گل‌دار بیشتر است.
- ✓ سه جفت (۶ عدد) پا دارند که جفت عقبی نسبت به جفت‌های جلویی، بزرگ‌تر می‌باشد.




گوارش

- ✓ لوله گوارش دارند.
- ✓ ملخ، حشره‌ای گیاه‌خوار است؛ پس دارای آنزیم سلولاز (آنزیم تجزیه کننده سلولز) می‌باشد.
- ✓ ملخ غذا را با استفاده از آرواره‌ها خرد و به دهان منتقل می‌کند.
- ✓ آغاز گوارش مکانیکی در ملخ، پیش از ورود مواد به دهان صورت می‌گیرد.
- ✓ ملخ حلق ندارد.
- ✓ چندین غده بزاقی در ملخ که در زیر چینه‌دان قرار دارند، از طریق یک مجرای مشترک، محتویات خود را به دهان می‌ریزند.
- ✓ غذای خردشده از طریق مری به چینه‌دان منتقل می‌شود.
- ✓ سپس غذا به بخش کوچکی به نام پیش معده وارد می‌شود. دیواره پیش معده دندان‌هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می‌کند. معده و کیسه‌های معده، آنزیم‌هایی ترشح می‌کنند که به پیش معده وارد می‌شود.
- ✓ جذب در معده صورت می‌گیرد.
- ✓ مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده، به راست‌روده وارد و سپس از مخرج دفع می‌شوند.
- ✓ مخرج ملخ نسبت به دهان آن، پشتی‌تر می‌باشد.



تنفس

- ✓ حشرات تنفس ناییدیسی دارند.
- ✓ نایدیسی‌ها، لوله‌هایی منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی به خارج راه دارند.
- ✓ منافذ تنفسی در ابتدای نایدیسی قرار دارند.
- ✓ منافذ تنفسی در همه بخش‌های بدن ملخ دیده نمی‌شود؛ این منافذ در سطح شکمی وجود دارند.
- ✓ نایدیسی به انشعابات کوچک‌تری تقسیم می‌شود. انشعابات پایانی که در کنار همه یاخته‌های بدن قرار می‌گیرند، بن‌بست بوده و دارای مایعی است که تبادلات گازی را ممکن می‌کند.
- ✓ دستگاه گردش مواد در حشرات، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.
- ✓ در همولنف این جانوران، اکسیژن دیده می‌شود اما همولنف نقشی در انتقال آن ندارد.
- ✓ دستگاه گردش مواد، در تنفس سلولی نقش دارد. گلوکز رو باید یکپوری به یافته‌ها برسونهیم دیگه! تامین گلوکز با دستگاه گردش مواد ولی تامین اکسیژن بر عهده دستگاه گردش مواد نیست!




گردش مواد

- ✓ بندپایانی مانند ملخ، سامانه گردش باز دارند.
- ✓ قلب در این سامانه، مایعی به نام همولنف را به حفره‌های بدن پمپ می‌کند.
- ✓ همولنف نقش‌های خون، لنف و آب میان بافتی را بر عهده دارد.
- ✓ در این جانوران، مویرگ دیده نمی‌شود و همولنف مستقیماً به فضای بین یاخته‌های بدن وارد می‌شود و در مجاورت آن‌ها جریان می‌یابد.
- ✓ همولنف از طریق رگ‌های متصل به قلب از آن خارج می‌شوند و از طریق منافذ دریچه‌دار به قلب بازمی‌گردند.
- ✓ بین قلب و رگ‌های متصل به آن دریچه وجود دارد که به سمت داخل رگ باز می‌شوند.



تنظیم اسمزی

- ✓ حشرات سامانه دفعی متصل به روده، به نام لوله‌های مالپیگی دارند.
- ✓ ماده دفعی در حشرات اوریک‌اسید است.
- ✓ اوریک‌اسید همراه با آب و نمک به لوله‌های مالپیگی وارد می‌شود.
- ✓ محتوای لوله‌های مالپیگی به روده، تخلیه و با عبور مایعات در روده، آب و یون‌ها بازجذب می‌شوند. اوریک‌اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.
- ✓ چند لوله مالپیگی می‌توانند از طریق یک منفذ مشترک به روده



متصل شوند.

✓ حجم یاخته‌هایی که در باز جذب آب و یون‌ها نقش دارند نسبت به سایر یاخته‌های روده بیشتر است.

دستگاه عصبی مرکزی

✓ مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.

✓ یک طناب عصبی شکمی در طول بدن جانور کشیده شده است.

✓ در هر بند از بدن، یک گره وجود دارد. هر گره، فعالیت ماهیچه‌های آن بند را تنظیم می‌کند.

✓ بلندترین و طولانی‌ترین عصب، درون پاهای عقبی ملخ قرار دارد.

✓ از مغز نیز تعدادی عصب منشعب می‌شوند که برخی به درون شاخک‌ها رفته است.

دستگاه عصبی محیطی

چشم مرکب

✓ چشم مرکب که در حشرات دیده می‌شود، از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است.

✓ در هر واحد بینایی، یک عدسی، یک قرنیه، تعدادی گیرنده نور و تعدادی رشته عصبی وجود دارد.

✓ هر یک از این واحدها، تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می‌کنند. دستگاه عصبی این جانور، این اطلاعات را یکپارچه و تصویری موزاییکی ایجاد می‌کند.

✓ برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می‌کنند.

گیرنده مکانیکی صدا در پا

✓ در جیرجیرک روی هر یک از پاهای جلویی، یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روی آن کشیده شده است.

✓ لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده‌های مکانیکی را که در پشت پرده صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می‌کند.

✓ پیام‌های این گیرنده‌ها ابتدا به طناب عصبی شکمی می‌رود.

گیرنده‌های شیمیایی

✓ در مگس، گیرنده‌های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای آن قرار دارند.


✓ مگس به کمک این گیرنده‌ها انواع مولکول‌ها را تشخیص می‌دهد.

✓ آکسون و دندريت گیرنده شیمیایی در مگس، از محل‌های متفاوتی از جسم سلولی خارج شده است.

✓ ابتدای دندريت گیرنده شیمیایی از موهای حسی روی پا خارج شده است.

✓ جسم سلولی و آکسون گیرنده شیمیایی نیز در خارج از موهای حسی قرار دارد.

✓ پیام‌های این گیرنده‌ها ابتدا به طناب عصبی شکمی می‌رود.



اسکلت، ارتباطات، ایمنی

✓ حشرات دارای اسکلت بیرونی هستند. در این جانوران، اسکلت علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی هم دارد.

✓ با افزایش اندازه جانور، اسکلت آن هم باید بزرگ‌تر و ضخیم‌تر شود. بزرگ بودن اسکلت خارجی باعث سنگین‌تر شدن آن می‌شود که در حرکات جانور

محدودیت ایجاد می‌کند. به همین علت اندازه این جانوران از حد خاصی بیشتر نمی‌شود.

✓ نیش حشرات، ویروس HIV را منتقل نمی‌کند.


✓ حشرات، ایمنی غیراختصاصی دارند.

✓ سازوکارهایی در برخی بی‌مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل می‌کند. باز هم نمیتونیم بگیم حشرات ایمنی اختصاصی دارند! مثلاً

در مگس میوه، مولکولی کشف شده که می‌تواند به صدها شکل مختلف درآید و پادگن‌های مختلفی را شناسایی کند.

تولید مثل

- ✓ در جانوران خشکی‌زی، لقاح داخلی (نیازمند دستگاه‌های تولیدمثلی با اندام‌های تخصص یافته) دیده می‌شود.
- ✓ حشرات تخم‌گذار می‌باشند.
- ✓ برخی حشرات نظیر زنبور، بکرزایی انجام می‌دهند.
- ✓ در بکرزایی زنبور، تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم میتوز می‌کند و جانور تک‌لاد ایجاد می‌شود.
- ✓ در جمعیت زنبورها، هر جاندار حاصل از بکرزایی قطعاً نر و هر جاندار حاصل از لقاح قطعاً ماده می‌باشد.
- ✓ در جمعیت زنبورها، گامت نر حاصل تقسیم میتوز و گامت ماده حاصل تقسیم میوز می‌باشد.



حشرات در دنیای گیاهان

- ✓ انواعی از گیاهان حشره‌خوار در مناطق فقیر از نظر نیتروژن وجود دارند که برخی از برگ‌های آن‌ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده است؛ مثل توبره‌هاش که در تالاب‌های شمال کشور می‌روید.
- ✓ برگ تله‌مانند گیاه گوشت‌خوار کرک‌هایی دارد که با برخورد حشره به آن‌ها تحریک و پیام‌هایی را به راه می‌اندازند که سبب بسته‌شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره می‌شود.
- ✓ برخی از حشرات نیش دارند. پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری‌زا به گیاه جلوگیری می‌کند.
- ✓ اکثر گرده‌افشان‌ها حشره‌اند.
- ✓ زنبورهای عسل، گل‌هایی را گرده‌افشانی می‌کنند که شهد آن‌ها قند فراوانی داشته باشد. این گل‌ها علائمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می‌شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می‌کند.
- ✓ حشرات کوچک نمی‌توانند روی برگ‌های کرک‌دار به راحتی حرکت کنند. همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می‌شود.
- ✓ گیاهان ترکیباتی تولید می‌کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاهخواران می‌شود؛ مثل ترکیبات سیانیددار که در لوله‌گوارش حشره، سیانید از آن جدا می‌شود.
- ✓ بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می‌کنند که در محافظت از آن‌ها نقش دارد. گاه حجم این ترکیبات آن‌قدر زیاد است که حشره در آن به دام می‌افتد. با سخت شدن این ترکیبات، سنگواره‌هایی تشکیل می‌شود که حشره در آن حفظ شده است.
- ✓ انبوهی از مورچه‌ها به حشره‌ای که قصد خوردن برگ‌های درخت آکاسیا را دارد هجوم می‌برند. این مورچه‌ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی نیز حمله می‌کنند.
- ✓ گرده‌افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبور است. وقتی گل‌های آکاسیا باز می‌شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می‌شود که با فراری دادن مورچه‌ها، مانع از حمله آن‌ها به زنبورهای گرده‌افشان شوند.
- ✓ بعضی گیاهان در برابر حمله گیاهخواران، مواد فراری تولید و در هوا پخش می‌کنند که سبب جلب جانوران دیگر می‌شود. با خورده شدن برگ گیاه تنباکو توسط نوزاد کرمی‌شکل، از یاخته‌های آسیب‌دیده برگ، ترکیب فراری متصاعد می‌شود که نوعی زنبوروحشی آن را شناسایی می‌کند. زنبور ماده‌ای که در آن اطراف زندگی می‌کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی‌شکل می‌رساند و روی آن تخم می‌گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی‌شکل تغذیه می‌کنند و در نتیجه آن را می‌کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است.

سخت‌پوستان



- ✓ دارای اسکلت بیرونی می‌باشند.
- ✓ ایمنی غیراختصاصی دارند.
- ✓ مواد دفعی نیتروژن‌دار با انتشار ساده از آبشش‌ها دفع می‌شود.
- ✓ در آبزیان مثل ماهی‌ها، دوزیستان و بی‌مهرگان آبی، لقاح خارجی دیده می‌شود.


نرم تنان مثل حلزون



- ✓ ایمنی غیراختصاصی دارند.

- ✓ حلزون از بی‌مهرگان خشکی‌زی است که برای تنفس از شش استفاده می‌کند.
- ✓ در جانوران خشکی‌زی، لقاح داخلی وجود دارد.

ستاره دریایی




- ✓ ساده‌ترین آبشش‌ها، برجستگی‌های کوچک و پراکنده پوستی هستند، مانند آبشش‌های ستاره دریایی
- ✓ پوست در ستاره دریایی از یک لایه سلول تشکیل شده است که در محل آبشش‌ها و برجستگی‌ها، تغییراتی در آن رخ داده است.
- ✓ یاخته‌های پوست در محل برجستگی‌ها نسبت به سایر یاخته‌های پوست، بزرگ‌تر می‌باشند.
- ✓ گازهای تنفسی برای ورود به مایعات بدن یا خروج از آن، از دو لایه سلولی عبور می‌کنند.
- ✓ لارو ستاره دریایی شفاف است.
- ✓ ایمنی غیراختصاصی دارند. مپینگو لارو ستاره دریایی رو مشاهده کرد ریگه!

ماهی‌ها



تنفس


- ✓ آبشش دارند. تبادل گاز از طریق آبشش، بسیار کارآمد است.
- ✓ جهت حرکت خون در مویرگ‌ها و عبور آب در طرفین تیغه‌های آبششی، برخلاف یکدیگر است.
- ✓ آب برای رسیدن به آبشش‌ها، از طریق دهان به بدن وارد می‌شود.
- ✓ در یک کمان آبششی، دو رگ از یک نوع (سرخرگ) دیده می‌شود.
- ✓ هر رشته آبششی، تعداد زیادی تیغه آبششی دارد که آب از طرفین آن‌ها عبور می‌کند.
- ✓ غیر از نوشیدن آب، باز و بسته شدن دهان در ماهی به منظور عبور آب و تبادل گازها نیز صورت می‌گیرد.



گردش مواد

- ✓ همه مهره‌داران سامانه گردش بسته دارند.
- ✓ ماهی‌ها و نوزاد دوزیستان، گردش خون ساده دارند. در گردش ساده، خون ضمن یکبار گردش در بدن، یکبار از قلب دو حفره‌ای آن عبور می‌کند. مزیت این سیستم، انتقال یکبار خون اکسیژن‌دار به تمام مویرگ‌های اندام‌هاست.
- ✓ خون تمام بدن از طریق سیاهرگ شکمی (خون تیره و فشارخون پایین) وارد سینوس سیاهرگی و سپس دهلیز می‌شود.
- ✓ دهلیز که بالاتر از بطن قرار دارد و نسبت به آن پشتی‌تر است، خون را به سمت پایین و درون بطن پمپ می‌کند.
- ✓ بطن که نسبت به دهلیز، ماهیچه بیشتری دارد، خون را وارد مخروط سرخرگی و سپس سرخرگ شکمی (خون تیره و فشارخون بالا) می‌کند.
- ✓ خون از طریق سرخرگ شکمی به آبشش‌ها وارد و تبادل گازهای تنفسی و یا دفع یا جذب یون‌ها صورت می‌گیرد.
- ✓ خون از طریق سرخرگ پشتی (روشن و فشارخون بالا) به همه بدن ارسال می‌شود؛ یعنی انشعابات به سمت جلو و عقب بدن می‌فرستد.

- ✓ از درون قلب ماهی، فقط خون تیره عبور می‌کند اما خود قلب از طریق انشعابات سرخرگ پستی و با خون روشن تغذیه می‌شود.
- ✓ به قلب ماهی همانند قلب انسان، خون تیره وارد می‌شود.
- ✓ بین سینوس سیاهرگی و دهلیز و بین بطن و مخروط سرخرگی، دریچه‌ای وجود دارد.




تنظیم اسمزی

- ✓ همه مهره‌داران کلیه دارند.
- ✓ ماهیان غضروفی (مثل کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها) که ساکن آب‌شور هستند، علاوه بر کلیه‌ها، دارای غدد راست‌روده‌ای هستند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می‌کنند؛ پس تنظیم اسمزی آن‌ها به کمک دستگاه گوارش نیز صورت می‌گیرد.
- ✓ در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از محیط بیشتر است؛ بنابراین آب می‌تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی نمی‌نوشند؛ نه اینکه اصلاً آب ن‌خورند!
- ✓ ماهیان آب شیرین، حجم زیادی از آب را به‌صورت ادرار رقیق دفع می‌کنند.
- ✓ در ماهیان آب‌شور فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از فشار اسمزی محیط است؛ بنابراین آب، تمایل به خروج از بدن دارد. در نتیجه، ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می‌نوشند. در این ماهیان برخی یون‌ها توسط کلیه به‌صورت ادرار غلیظ و برخی از طریق یاخته‌های آبشش دفع می‌شوند.
- ✓ در ماهیان آب‌شور، میزان یون‌های سرخرگ شکمی از سرخرگ پستی بیشتر است.

دستگاه عصبی

- ✓ در مهره‌داران طناب عصبی پستی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می‌دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه‌ای غضروفی، یا استخوانی جای گرفته است.
- ✓ در مهره‌داران نیز مانند ماهی‌ها، دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
- ✓ در دو سوی بدن همه ماهی‌ها ساختاری به نام خط جانبی وجود دارد. این ساختار، کانالی در زیرپوست جانور است که از راه سوراخ‌هایی با محیط بیرون ارتباط دارد. درون کانال، یاخته‌های مؤکداری قرار دارند که به ارتعاش آب حساس‌اند. مؤک‌های این یاخته‌ها در ماده‌ای ژلاتینی قرار دارند. جریان آب در کانال، ماده ژلاتینی را به حرکت درمی‌آورد. حرکت ماده ژلاتینی، یاخته‌های گیرنده را تحریک می‌کند و ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر (شکار و شکارچی) در پیرامون خود آگاه می‌شود.




- ✓ مؤک‌های یاخته‌های گیرنده خط جانبی به‌طور کامل در ماده ژلاتینی قرار دارند.

- ✓ مؤک‌های یاخته‌های گیرنده خط جانبی، اندازه‌های یکسانی ندارند.

- ✓ در ساختار خط جانبی، دو نوع یاخته دیده می‌شود:

الف) یاخته گیرنده: بزرگ‌تر + تعداد کمتر + هسته بزرگ‌تر + دارای مؤک

ب) یاخته پشتیبان: کوچک‌تر + تعداد بیشتر + هسته کوچک‌تر + فاقد مؤک



- ✓ یاخته گیرنده برخلاف یاخته پشتیبان، با رشته‌های عصبی در ارتباط می‌باشد.
- ✓ هسته سلول‌های گیرنده و پشتیبان در مرکز سلول قرار نداشته و قاعده‌ای می‌باشد.
- ✓ لوب‌های بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب‌های بویایی انسان بزرگ‌تر می‌باشد.
- ✓ از جلو به عقب در مغز ماهی، لوب‌های بویایی، مخ، لوب‌های بینایی، مخچه و بصل النخاع وجود دارد.
- ✓ لوب‌های بینایی، بزرگ‌ترین بخش مغز ماهی می‌باشد.
- ✓ لوب‌های بینایی و مخچه نسبت به مخ بزرگ‌تر می‌باشند.
- ✓ در ماهی همانند انسان، قطر نخاع از بصل النخاع کمتر است.

اسکلت و ایمنی

- ✓ مهره‌داران مانند ماهی‌ها، اسکلت درونی دارند.
- ✓ در انواعی از ماهی‌ها نظیر کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است اما در سایر مهره‌داران، استخوانی است که غضروف نیز دارد.
- ✓ ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه به ساختار استخوان انسان است.
- ✓ مهره‌داران از قبیل ماهی‌ها، دارای ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی هستند.

تولیدمثل

- ✓ در آبزیان مثل ماهی‌ها و نوزاد دوزیستان، لقاح خارجی وجود دارد.
- ✓ در این روش، والدین گامت‌های خود را در آب می‌ریزند و لقاح در آب صورت می‌گیرد.
- ✓ برای افزایش احتمال برخورد گامت‌ها، والدین تعداد زیادی گامت را هم‌زمان وارد آب می‌کنند. برای هم‌زمان شدن ورود یاخته‌های جنسی به آب عوامل متعددی دخالت دارد. از جمله دمای محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده یا بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی‌ها.
- ✓ مواد غذایی موردنیاز جنین تا چند روز پس از لقاح و تشکیل تخم از اندوخته غذایی تخمک تأمین می‌شود. این اندوخته مخلوطی از مواد مغذی متفاوت است. اندازه تخمک در جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد. در ماهی‌ها و دوزیستان به علت دوره جنینی کوتاه میزان این اندوخته کم است.
- ✓ در جانورانی مثل ماهی‌ها که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره‌ای چسبناک و ژله‌ای دارد که پس از لقاح، تخم‌ها را به هم می‌چسباند. این لایه ژله‌ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می‌کند و سپس به عنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار می‌گیرد.


دوزیستان




- ✓ طول پاهای عقبی آن‌ها از پاهای جلویی آن‌ها بیشتر است.
- ✓ بین انگشتان پاهای آن‌ها، پرده‌ای مشاهده می‌شود.

تنفس

- ✓ نوزادان دوزیستان (که توانایی تولیدمثل ندارند) دارای آبشش می‌باشند.
- ✓ در دوزیستان بالغ، تنفس پوستی و شش دیده می‌شود.
- ✓ در قورباغه، پمپ فشار مثبت دیده می‌شود. در این جانور به کمک ماهیچه‌های حلق و دهان و با حرکتی شبیه به قورت دادن، هوا با فشار به درون شش‌ها رانده می‌شود. فرآیند دم در قورباغه در دو مرحله بررسی می‌شود:
- الف) بینی باز و حجم حفره دهانی افزایش می‌یابد. در این زمان ماهیچه‌های حلق و دهان در حال استراحت می‌باشند.
- ب) سپس بینی بسته شده و ماهیچه‌های حلق و دهان منقبض می‌شوند و هوا با فشار به درون شش‌ها رانده می‌شود.



گردش مواد



دوزیست
قلب سه حفره‌ای،
گردش خون مضاعف

- ✓ نوزادان دوزیستان، قلبی دو حفره‌ای (یک بطن و یک دهلیز) و گردش خون ساده دارند.
- ✓ سامانه گردش مضاعف از دوزیستان به بعد شکل گرفته است.
- ✓ دوزیستان **بالغ**، قلب سه حفره‌ای با دو دهلیز و یک بطن دارند که بطن خون را یکبار به شش‌ها و پوست و سپس به بقیه بدن تلمبه می‌کند.
- ✓ در سامانه گردش مضاعف دوزیستان، خون تیره و روشن تا حدی مخلوط می‌شود.
- ✓ در سامانه گردش مضاعف، بطن در هر بار چرخه قلب دو بار منقبض می‌شود! یکبار خون را به شش‌ها و پوست و یکبار به بقیه بدن می‌فرستد.

تنظیم اسمزی

- ✓ همه مهره‌داران کلیه دارند.
- ✓ مثانه دوزیستان محل ذخیره آب و یون‌هاست. به‌هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگ‌تر می‌شود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون **افزایش** پیدا می‌یابد؛ نه اینکه آغاز شود!
- ✓ در دوزیستان و برخلاف انسان، ترکیب ادرار پس از خروج از کلیه و در مثانه می‌تواند تغییر کند.
- ✓ در دوزیستان، بسته به شرایط محیط، اندازه مثانه متفاوت می‌باشد.


دستگاه عصبی، اسکلت، ایمنی و تولیدمثل

- ✓ در دوزیستان طناب عصبی **پشتی** است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می‌دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه‌ای استخوانی جای گرفته است.
- ✓ دوزیستان اسکلت درونی (استخوان و غضروف) دارند. ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه به ساختار استخوان انسان است.
- ✓ دوزیستان ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی دارند.
- ✓ در دوزیستان لقاح خارجی دیده می‌شود؛ در این روش، والدین تعداد زیادی گامت را به‌طور هم‌زمان وارد آب می‌کنند.
- ✓ اندوخته غذایی تخمک دوزیستان به علت دوره جنینی کوتاه، اندک است.
- ✓ تخمک دوزیستان، دیواره‌ای چسبناک و ژله‌ای دارد که پس از لقاح، تخم‌ها را به هم می‌چسباند. این لایه ژله‌ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می‌کند و سپس به‌عنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار می‌گیرد.

خزندگان




دستگاه گردش مواد و تنظیم اسمزی



- ✓ خزندگان قلبی چهار حفره‌ای (دو دهلیز و دو بطن) دارند.
- ✓ جدایی کامل بطن‌ها در بیشتر خزندگان دیده نمی‌شود و خون تیره و روشن در آن‌ها به مقداری مخلوط می‌شود.
- ✓ در برخی خزندگان نظیر کروکدیل‌ها، جدایی کامل بطن‌ها دیده می‌شود.
- ✓ همه مهره‌داران از جمله خزندگان، کلیه دارند.
- ✓ کلیه در خزندگان، توانمندی زیادی در باز جذب آب دارد.
- ✓ برخی (نه همه) خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، می‌توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان (و نه هردو!) به‌صورت قطره‌های غلیظ دفع کنند.
- ✓ غده نمکی نزدیک چشم، در بالای چشم قرار گرفته است.


دستگاه عصبی، اسکلت، ارتباطات شیمیایی و ایمنی



- ✓ در خزندگان طناب عصبی **پشتی** است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می‌دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه‌ای استخوانی جای گرفته است.
- ✓ برخی (نه اغلب!) مارها نظیر مار زنگی، پرتوهای فروسرخ را تشخیص می‌دهند. در **جلو** و **زیر** هر چشم مار زنگی، سوراخی است که گیرنده‌های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این گیرنده‌ها، مار پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را دریافت می‌کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می‌دهد.


- ✓ دمای بدن موش و مار از انسان کمتر است.
- ✓ از هر بخش بدن موش پرتو فروسرخ بازتابیده نمی‌شود؛ مثل دم آن
- ✓ خزندگان همانند سایر مهره‌داران، اسکلت درونی دارند. این اسکلت علاوه بر حرکت، در حفاظت از بخش‌هایی از بدن نیز نقش دارد.
- ✓ مارها از فرومون‌ها برای جفت‌یابی استفاده می‌کنند.
- ✓ خزندگان، دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارند.

تولیدمثل




- ✓ بعضی مارها بکرزایی دارند. در پی میوز مار ماده، تخمک ایجاد می‌شود. سپس از روی فام‌تن‌های تخمک، یک نسخه ساخته می‌شود تا فام‌تن‌های آن دو برابر شوند. سپس شروع به تقسیم میتوز می‌کند و جاندارای دولد پدید می‌آید.
- ✓ جاندار حاصل از بکرزایی مار ماده برخلاف زنبور ماده، دیپلوئید می‌باشد.
- ✓ جاندار حاصل از بکرزایی مار ماده، از نظر تمام صفات‌های دو آلی خود، خالص می‌باشد.
- ✓ لقاح خزندگان از نوع داخلی است.
- ✓ در جانوران تخم‌گذار، اندوخته غذایی تخمک زیاد است.
- ✓ در جانوران تخم‌گذار، پوسته ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت می‌کند.
- ✓ برای محافظت بیشتر در خزندگانی مثل لاک‌پشت‌ها، تخم‌ها با ماسه و خاک پوشانده می‌شود.

پرندگان




- ✓ در پراکنش میوه‌ها نقش دارند.
- ✓ هرپای پرندگان دانه خوار، ۴ انگشت دارد که بین آن‌ها، پرده‌ای مشاهده نمی‌شود.
- ✓ پرندگان دانه‌خوار همانند ملخ، چینه‌دان دارند.
- ✓ در پرندگان دانه‌خوار، چینه‌دان از سنگدان بزرگ‌تر می‌باشد.
- ✓ سنگدان، پشته‌ترین بخش لوله گوارش در پرندگان دانه‌خوار می‌باشد و از بخش عقبی معده تشکیل شده است.
- ✓ کبد، ترشحات خود را از راه مجرای به روده باریک می‌ریزد.
- ✓ در پرندگان دانه خوار همانند انسان، طول روده باریک از روده بزرگ بیشتر و قطر آن کمتر است.
- ✓ در انتهای لوله گوارش پرندگان دانه خوار، ساختار این لوله تغییراتی می‌کند.
- ✓ برخی مواد غذایی بلع شده در پرندگان که ارزش غذایی چندانی ندارد مثل سنگریزه‌ها، فرآیند آسیاب کردن غذا را تسهیل می‌کنند.
- ✓ بلع سنگریزه‌ها توسط پرندگان دانه‌خوار با رفتار غذایی بهینه توجیه نمی‌شود.

تنفس



- ✓ پرندگان به علت پرواز نسبت به سایر مهره‌داران انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و بنابراین به اکسیژن بیشتری نیاز دارند.
- ✓ پرندگان علاوه بر شش‌ها، دارای ساختارهایی به نام کیسه‌های هوادار هستند که کارایی تنفس آن‌ها را نسبت به پستانداران افزایش می‌دهد.
- ✓ ۵ عدد کیسه هوادار جلویی و ۴ عدد کیسه هوادار عقبی در پرندگان یافت می‌شود.
- ✓ کیسه‌های هوادار عقبی نسبت به کیسه‌های هوادار عقبی، بزرگ‌تر می‌باشند.
- ✓ یکی از کیسه‌های هوادار جلویی (قرمز رنگ) بین هردو شش مشترک می‌باشد.


گردش مواد و تنظیم اسمزی



- ✓ پرندگان قلبی چهار حفره‌ای و گردش خون مضاعف دارند.
- ✓ در پرندگان، جدایی کامل بطن‌ها رخ داده است.
- ✓ کلیه در خزندگان، توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد.
- ✓ برخی (نه همه) خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، می‌توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان (و نه هردو!) به صورت قطره‌های غلیظ دفع کنند.
- ✓ غده نمکی نزدیک چشم، در بالای چشم قرار گرفته است.

دستگاه عصبی، اسکلت، ایمنی، مرگ برنامه‌ریزی شده و تولیدمثل

- ✓ در پرندگان طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می‌دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه‌ای استخوانی جای گرفته است.
- ✓ در بین مهره‌داران، اندازه نسبی مغز پرندگان و پستانداران نسبت به وزن بدن، از بقیه بیشتر است.
- ✓ اسکلت پرندگان از نوع درونی (استخوان + غضروف) است که علاوه بر حرکت، در حفاظت از بدن نیز نقش دارد.
- ✓ ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی دارند؛ بنابراین می‌توانند پادتن بسازند.
- ✓ برخی ویروس‌ها، پرندگان را آلوده می‌کنند. آنفولانزای پرندگان را ویروسی پدید می‌آورد که می‌تواند سایر گونه‌ها از جمله انسان را نیز آلوده کند و سبب می‌شود دستگاه ایمنی بیش‌ازحد معمول فعالیت کند. بدین ترتیب به تولید انبوه و بیش از اندازه لنفوسیت‌های T می‌انجامد.




- ✓ مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته‌ای شامل یک‌سری فرایندهای دقیقاً برنامه‌ریزی شده است که در بعضی یاخته‌ها و در شرایط خاص ایجاد می‌شود. حذف یاخته‌های اضافی از بخش‌های عملکردی مانند پرده‌های بین انگشتان پا در پرندگان، مثالی از این نوع مرگ است.
- ✓ پرندگان لقاح داخلی دارند.
- ✓ اندوخته غذایی تخمک به دلیل تخم‌گذار بودن آن‌ها زیاد است.
- ✓ وجود پوسته ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت می‌کند.
- ✓ پرندگان روی تخم‌ها می‌خوانند.
- ✓ بال کبوتر (نوعی پرنده) و بال پروانه، آنالوگ‌اند.

پستانداران



- ✓ همانند پرندگان در پراکنش میوه‌ها نقش دارند.



گوارش

- ✓ پستانداران نشخوارکننده، نظیر گاو و گوسفند، معده چهار قسمتی دارند در این جانوران، معده، شامل کیسه بزرگی به نام سیرابی؛ بخشی به نام نگاری؛ یک اتاقک لایه لایه به نام هزارلا و معده واقعی یا شیردان است.
- ✓ این جانوران به سرعت غذا می‌خورند تا در فرصت مناسب با مکانی امن، غذا را با نشخوار کردن به دهان برگردانند و بچوند. ابتدا غذای نیمه جویده بلعیده و وارد سیرابی می‌شود و در آنجا به کمک میکروب‌ها تا حدی گوارش می‌یابد.
- ✓ توده‌های غذا سپس به نگاری وارد و به دهان برمی‌گردند. در این زمان غذا به‌طور کامل، جویده و دوباره به سیرابی وارد می‌شود، بیشتر حالت مایع پیدا می‌کند و سپس به نگاری جریان می‌یابد. مواد از آنجا به هزارلا رفته تا حدودی آگیری و سرانجام به شیردان وارد می‌شوند. در این محل آنزیم‌های گوارشی وارد عمل می‌شوند و گوارش ادامه پیدا می‌کند.
- ✓ وجود میکروب‌ها برای گوارش سلولز ضروری است. سلولز مقدار زیادی انرژی دارد ولی اغلب (نه بعضی) جانوران (نه جانداران) فاقد توانایی تولید آنزیم لازم برای گوارش آن هستند.
- ✓ در نشخوارکنندگان، گوارش میکروبی نسبت به آنزیمی، زودتر آغاز می‌شود.
- ✓ پس از ورود توده غذایی برای بار دوم به سیرابی، توده غذایی بیشتر حالت مایع پیدا می‌کند.
- ✓ جذب در معده گاو دیده می‌شود؛ آگیری (جذب آب و افزایش فشار اسمزی) در بخشی از معده به‌نام هزارلا رخ می‌دهد.
- ✓ منفذ بین مری و سیرابی از منفذ بین نگاری و هزارلا بزرگ‌تر است.
- ✓ مواد غذایی برای خروج از شیردان و ورود به روده باریک، به سمت بالا حرکت می‌کند.
- ✓ در فضای درون سیرابی گاو، برجستگی‌هایی مشاهده می‌شود.

تنفس، گردش مواد و تنظیم اسمزی

- ✓ سازوکار فشار منفی دارند؛ هوا به‌وسیله مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه به شش‌ها وارد می‌شود.
- ✓ در پستانداران نشخوارکننده، قبل از دو نایژه اصلی، یک انشعاب سوم نیز وجود دارد که به شش راست می‌رود.
- ✓ پستانداران نشخوارکننده همانند انسان، دو نایژه اصلی دارند اما برخلاف انسان، سه انشعاب از نای آن جدا می‌شود.
- ✓ نای در پستانداران نشخوارکننده، واجد ۴ مدخل می‌باشد:
- ✓ ۱) مدخل ورود هوا به نای ۲) مدخل نایژه اصلی راست ۳) مدخل نایژه اصلی چپ ۴) مدخل انشعاب سوم
- ✓ پستانداران قلبی چهار حفره‌ای و گردش خون مضاعف دارند که بطن‌های آن‌ها به‌طور کامل از یکدیگر جدا شده است.
- ✓ همه مهره‌داران از جمله پستانداران، کلیه دارند.

دستگاه عصبی، اسکلت، ارتباطات شیمیایی و ایمنی

- ✓ در پستانداران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می‌دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه‌ای استخوانی جای گرفته است. در سایر پستانداران همانند انسان، دستگاه عصبی شامل بخش‌های مرکزی و محیطی است.
- ✓ در بین مهره‌داران، اندازه نسبی مغز پرندها و پستانداران نسبت به وزن بدن، از بقیه بیشتر است.
- ✓ پستانداران همانند بقیه مهره‌داران، اسکلت درونی دارند. اسکلت درونی آن‌ها استخوانی است که غضروف نیز دارد.
- ✓ گریه‌ها (نوعی پستاندار) از فرومون‌ها برای تعیین قلمرو خود استفاده می‌کنند.
- ✓ پستانداران دارای ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی می‌باشند.

تولیدمثل و نقش آن‌ها در دنیای گیاهان

- ✓ در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین، میزان اندوخته غذایی تخمک کم است.
- ✓ پستاندار تخم‌گذاری مثل پلاتیپوس، تخم را در بدن خود نگه می‌دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم‌گذاری می‌کند و روی آن‌ها می‌خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی شود.
- ✓ در پستانداران کیسه‌دار، مثل کانگورو جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشدونمو را آغاز می‌کند. به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می‌شود و خود را به درون کیسه‌ای که بر روی شکم مادر است می‌رساند. در آنجا ضمن حفاظت، از غدد شیری درون آن تغذیه می‌کند تا مراحل رشدونمو را کامل کند.
- ✓ مراحل نهایی رشد و نمو جنین در پلاتیپوس همانند کانگورو، در خارج از بدن مادر رخ می‌دهد.
- ✓ در پستانداران جفت‌دار، جنین درون رحم مادر رشدونمو را آغاز و از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط می‌شود و از آن تغذیه می‌کند. نوزاد پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه می‌کند تا زمانی که بتواند به‌طور مستقل به زندگی ادامه دهد.
- ✓ خفاش‌ها، گروهی از پستانداران هستند که در گرده‌افشانی نقش دارند.
- ✓ بعضی گرده‌افشان‌ها مانند خفاش‌ها، در شب تغذیه می‌کنند. این جانوران، گل‌هایی با گلبرگ‌های سفید را گرده‌افشانی می‌کنند.